

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 70 - Haute-Saône

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 4 344 | 2 019 | 2 325 | 1 167 | 1 282 | 852 | 1 043 |
| | 55-59 ans | 4 141 | 1 859 | 2 282 | 324 | 348 | 1 535 | 1 934 |
| | 60-64 ans | 5 118 | 2 405 | 2 713 | 353 | 339 | 2 052 | 2 374 |
| | 65-69 ans | 4 233 | 2 025 | 2 208 | 248 | 222 | 1 777 | 1 986 |
| | 70-74 ans | 2 932 | 1 368 | 1 564 | 134 | 156 | 1 234 | 1 408 |
| | 50-74 ans | 20 768 | 9 676 | 11 092 | 2 226 | 2 347 | 7 450 | 8 745 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 284 | 151 | 133 | 99 | 79 | 52 | 54 |
| | 55-59 ans | 309 | 143 | 166 | 37 | 45 | 106 | 121 |
| | 60-64 ans | 337 | 163 | 174 | 31 | 21 | 132 | 153 |
| | 65-69 ans | 281 | 113 | 168 | 22 | 27 | 91 | 141 |
| | 70-74 ans | 215 | 82 | 133 | 13 | 18 | 69 | 115 |
| | 50-74 ans | 1 426 | 652 | 774 | 202 | 190 | 450 | 584 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 224 | 119 | 105 | 77 | 60 | 42 | 45 |
| | 55-59 ans | 253 | 117 | 136 | 26 | 30 | 91 | 106 |
| | 60-64 ans | 276 | 130 | 146 | 22 | 13 | 108 | 133 |
| | 65-69 ans | 235 | 93 | 142 | 20 | 21 | 73 | 121 |
| | 70-74 ans | 171 | 64 | 107 | 10 | 14 | 54 | 93 |
| | 50-74 ans | 1 159 | 523 | 636 | 155 | 138 | 368 | 498 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 60 | 32 | 28 | 22 | 19 | 10 | 9 |
| | 55-59 ans | 56 | 26 | 30 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| | 60-64 ans | 61 | 33 | 28 | 9 | 8 | 24 | 20 |
| | 65-69 ans | 46 | 20 | 26 | 2 | 6 | 18 | 20 |
| | 70-74 ans | 44 | 18 | 26 | 3 | 4 | 15 | 22 |
| | 50-74 ans | 267 | 129 | 138 | 47 | 52 | 82 | 86 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 4 284 | 1 987 | 2 297 | 1 145 | 1 263 | 842 | 1 034 |
| | 55-59 ans | 4 085 | 1 833 | 2 252 | 313 | 333 | 1 520 | 1 919 |
| | 60-64 ans | 5 057 | 2 372 | 2 685 | 344 | 331 | 2 028 | 2 354 |
| | 65-69 ans | 4 187 | 2 005 | 2 182 | 246 | 216 | 1 759 | 1 966 |
| | 70-74 ans | 2 888 | 1 350 | 1 538 | 131 | 152 | 1 219 | 1 386 |
| | 50-74 ans | 20 501 | 9 547 | 10 954 | 2 179 | 2 295 | 7 368 | 8 659 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 90 | 51 | 39 | 26 | 22 | 25 | 17 |
| | 55-59 ans | 86 | 45 | 41 | 8 | 7 | 37 | 34 |
| | 60-64 ans | 115 | 66 | 49 | 12 | 4 | 54 | 45 |
| | 65-69 ans | 110 | 62 | 48 | 11 | 6 | 51 | 42 |
| | 70-74 ans | 101 | 54 | 47 | 9 | 8 | 45 | 39 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 70 - Haute-Saône

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 502 | 278 | 224 | 66 | 47 | 212 | 177 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 90 | 51 | 39 | 26 | 22 | 25 | 17 |
| | 55-59 ans | 86 | 45 | 41 | 8 | 7 | 37 | 34 |
| | 60-64 ans | 115 | 66 | 49 | 12 | 4 | 54 | 45 |
| | 65-69 ans | 110 | 62 | 48 | 11 | 6 | 51 | 42 |
| | 70-74 ans | 99 | 53 | 46 | 9 | 8 | 44 | 38 |
| | 50-74 ans | 500 | 277 | 223 | 66 | 47 | 211 | 176 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 56 | 34 | 22 | 14 | 12 | 20 | 10 |
| | 55-59 ans | 62 | 35 | 27 | 4 | 3 | 31 | 24 |
| | 60-64 ans | 86 | 49 | 37 | 8 | 2 | 41 | 35 |
| | 65-69 ans | 88 | 50 | 38 | 7 | 4 | 43 | 34 |
| | 70-74 ans | 76 | 39 | 37 | 7 | 6 | 32 | 31 |
| | 50-74 ans | 368 | 207 | 161 | 40 | 27 | 167 | 134 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 44 | 26 | 18 | 13 | 9 | 13 | 9 |
| | 55-59 ans | 48 | 25 | 23 | 4 | 2 | 21 | 21 |
| | 60-64 ans | 65 | 33 | 32 | 4 | 2 | 29 | 30 |
| | 65-69 ans | 65 | 35 | 30 | 3 | 4 | 32 | 26 |
| | 70-74 ans | 61 | 34 | 27 | 7 | 5 | 27 | 22 |
| | 50-74 ans | 283 | 153 | 130 | 31 | 22 | 122 | 108 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 56 | 34 | 22 | 14 | 12 | 20 | 10 |
| | 55-59 ans | 62 | 35 | 27 | 4 | 3 | 31 | 24 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 70 - Haute-Saône

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 86 | 49 | 37 | 8 | 2 | 41 | 35 |
| | 65-69 ans | 87 | 50 | 37 | 7 | 4 | 43 | 33 |
| | 70-74 ans | 75 | 39 | 36 | 7 | 6 | 32 | 30 |
| | 50-74 ans | 366 | 207 | 159 | 40 | 27 | 167 | 132 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 52 | 33 | 19 | 14 | 10 | 19 | 9 |
| | 55-59 ans | 62 | 35 | 27 | 4 | 3 | 31 | 24 |
| | 60-64 ans | 84 | 48 | 36 | 8 | 2 | 40 | 34 |
| | 65-69 ans | 86 | 48 | 38 | 6 | 4 | 42 | 34 |
| | 70-74 ans | 76 | 39 | 37 | 7 | 6 | 32 | 31 |
| | 50-74 ans | 360 | 203 | 157 | 39 | 25 | 164 | 132 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 56 | 34 | 22 | 14 | 12 | 20 | 10 |
| | 55-59 ans | 63 | 35 | 28 | 4 | 4 | 31 | 24 |
| | 60-64 ans | 86 | 49 | 37 | 8 | 2 | 41 | 35 |
| | 65-69 ans | 88 | 50 | 38 | 7 | 4 | 43 | 34 |
| | 70-74 ans | 77 | 39 | 38 | 7 | 6 | 32 | 32 |
| | 50-74 ans | 370 | 207 | 163 | 40 | 28 | 167 | 135 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 32 | 19 | 13 | 8 | 5 | 11 | 8 |
| | 55-59 ans | 29 | 10 | 19 | 0 | 3 | 10 | 16 |
| | 60-64 ans | 49 | 24 | 25 | 4 | 2 | 20 | 23 |
| | 65-69 ans | 31 | 14 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 |
| | 70-74 ans | 44 | 20 | 24 | 6 | 3 | 14 | 21 |
| | 50-74 ans | 185 | 87 | 98 | 19 | 16 | 68 | 82 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 70 - Haute-Saône

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| | 55-59 ans | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| | 60-64 ans | 19 | 13 | 6 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| | 65-69 ans | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| | 70-74 ans | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| | 50-74 ans | 68 | 45 | 23 | 5 | 3 | 40 | 20 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| | 70-74 ans | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| | 50-74 ans | 50 | 38 | 12 | 8 | 0 | 30 | 12 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 24 | 11 | 13 | 4 | 3 | 7 | 10 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 70 - Haute-Saône

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| | 55-59 ans | 19 | 16 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 |
| | 60-64 ans | 25 | 18 | 7 | 3 | 0 | 15 | 7 |
| | 65-69 ans | 40 | 25 | 15 | 2 | 0 | 23 | 15 |
| | 70-74 ans | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| | 50-74 ans | 119 | 84 | 35 | 13 | 3 | 71 | 32 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| | 70-74 ans | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| | 50-74 ans | 50 | 38 | 12 | 8 | 0 | 30 | 12 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 70 - Haute-Saône

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | 65-69 ans | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| | 70-74 ans | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| | 50-74 ans | 42 | 33 | 9 | 6 | 0 | 27 | 9 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| | 65-69 ans | 22 | 15 | 7 | 1 | 0 | 14 | 7 |
| | 70-74 ans | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| | 50-74 ans | 54 | 41 | 13 | 8 | 0 | 33 | 13 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 24 | 11 | 13 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 23 | 11 | 12 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 70 - Haute-Saône

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 23 | 11 | 12 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 70 - Haute-Saône

| Effectifs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 22 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 26 | 15 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 |
| | 55-59 ans | 19 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| | 60-64 ans | 24 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 9 |
| | 65-69 ans | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| | 70-74 ans | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| | 50-74 ans | 102 | 60 | 42 | 21 | 13 | 39 | 29 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 70 - Haute-Saône

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 6,5 | 7,5 | 5,7 | 8,5 | 6,2 | 6,1 | 5,2 |
| | 55-59 ans | 7,5 | 7,7 | 7,3 | 11,4 | 12,9 | 6,9 | 6,3 |
| | 60-64 ans | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 8,8 | 6,2 | 6,4 | 6,4 |
| | 65-69 ans | 6,6 | 5,6 | 7,6 | 8,9 | 12,2 | 5,1 | 7,1 |
| | 70-74 ans | 7,3 | 6 | 8,5 | 9,7 | 11,5 | 5,6 | 8,2 |
| | 50-74 ans | 6,9 | 6,7 | 7 | 9,1 | 8,1 | 6 | 6,7 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 3,4 | 4,3 | 1 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 1,2 | 1,4 | 1 | 2,5 | 2,4 | 1,2 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 1 | 1,2 | 0,8 | 2,7 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 1,2 | 1,6 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,2 | 1,1 | 1 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 78,9 | 78,8 | 78,9 | 77,8 | 75,9 | 80,8 | 83,3 |
| | 55-59 ans | 81,9 | 81,8 | 81,9 | 70,3 | 66,7 | 85,8 | 87,6 |
| | 60-64 ans | 81,9 | 79,8 | 83,9 | 71 | 61,9 | 81,8 | 86,9 |
| | 65-69 ans | 83,6 | 82,3 | 84,5 | 90,9 | 77,8 | 80,2 | 85,8 |
| | 70-74 ans | 79,5 | 78 | 80,5 | 76,9 | 77,8 | 78,3 | 80,9 |
| | 50-74 ans | 81,3 | 80,2 | 82,2 | 76,7 | 72,6 | 81,8 | 85,3 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,1 | 2,6 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 3 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 1,8 |
| | 60-64 ans | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 1,2 | 2,7 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 4,5 | 2,8 | 2,9 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 3,5 | 4 | 3,1 | 6,9 | 5,3 | 3,7 | 2,8 |
| | 50-74 ans | 2,4 | 2,9 | 2 | 3 | 2 | 2,9 | 2 |
| 50-74 ans ** | 2,4 | 2,9 | 2 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 98 | 98,1 | 97,9 | 100 | 100 | 97,8 | 97,4 |
| | 50-74 ans | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 100 | 100 | 99,5 | 99,4 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 62,2 | 66,7 | 56,4 | 53,8 | 54,5 | 80 | 58,8 |
| | 55-59 ans | 72,1 | 77,8 | 65,9 | 50 | 42,9 | 83,8 | 70,6 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 70 - Haute-Saône

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 74,8 | 74,2 | 75,5 | 66,7 | 50 | 75,9 | 77,8 |
| | 65-69 ans | 80 | 80,6 | 79,2 | 63,6 | 66,7 | 84,3 | 81 |
| | 70-74 ans | 76,8 | 73,6 | 80,4 | 77,8 | 75 | 72,7 | 81,6 |
| | 50-74 ans | 73,6 | 74,7 | 72,2 | 60,6 | 57,4 | 79,1 | 76,1 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 78,6 | 76,5 | 81,8 | 92,9 | 75 | 65 | 90 |
| | 55-59 ans | 77,4 | 71,4 | 85,2 | 100 | 66,7 | 67,7 | 87,5 |
| | 60-64 ans | 75,6 | 67,3 | 86,5 | 50 | 100 | 70,7 | 85,7 |
| | 65-69 ans | 73,9 | 70 | 78,9 | 42,9 | 100 | 74,4 | 76,5 |
| | 70-74 ans | 80,3 | 87,2 | 73 | 100 | 83,3 | 84,4 | 71 |
| | 50-74 ans | 76,9 | 73,9 | 80,7 | 77,5 | 81,5 | 73,1 | 80,6 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 124 | 141 | 96 | 138 | 124 | 144 | 69 |
| | 55-59 ans | 85 | 85 | 86 | 56 | 162 | 88 | 77 |
| | 60-64 ans | 88 | 96 | 78 | 181 | 58 | 79 | 79 |
| | 65-69 ans | 89 | 94 | 82 | 149 | 91 | 86 | 81 |
| | 70-74 ans | 99 | 85 | 113 | 146 | 89 | 72 | 118 |
| | 50-74 ans | 95 | 99 | 91 | 142 | 109 | 89 | 87 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 71 (51-120) | 86 (61-151) | 68,5 (43-97,5) | 78 (61-164) | 62 (43-115) | 90 (59-134) | 68,5 (59-81) |
| | 55-59 ans | 74 (49-93) | 65 (48-93) | 75 (51-100) | 47 (33,5-78) | 150 (57-280) | 71,5 (49-93) | 74,5 (48-85) |
| | 60-64 ans | 69 (54-85) | 68,5 (57,5-84) | 69,5 (50-95,5) | 81,5 (66,5-103) | 57,5 (54-61) | 66,5 (56,5-83) | 71 (49-96) |
| | 65-69 ans | 74,5 (55-117) | 75,5 (55-122) | 71,5 (56-100) | 111,5 (70-178) | 90,5 (47,5-133,5) | 74,5 (55-117) | 71,5 (56-99) |
| | 70-74 ans | 67 (48-96) | 66 (50-90) | 77 (48-114) | 97 (48-182) | 70 (37-120) | 64 (50,5-78) | 77 (49-108) |
| | 50-74 ans | 71 (51-99) | 70,5 (51-99) | 71 (49-100) | 86 (57-151) | 63 (43-120) | 69 (51-93) | 71,5 (50,5-95,5) |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 70 - Haute-Saône

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 28,9 | 29,4 | 28,2 | 42,3 | 36,4 | 16 | 17,6 |
| | 55-59 ans | 22,1 | 17,8 | 26,8 | 37,5 | 28,6 | 13,5 | 26,5 |
| | 60-64 ans | 20,9 | 22,7 | 18,4 | 25 | 0 | 22,2 | 20 |
| | 65-69 ans | 14,5 | 16,1 | 12,5 | 27,3 | 33,3 | 13,7 | 9,5 |
| | 70-74 ans | 16,8 | 22,2 | 10,6 | 11,1 | 12,5 | 24,4 | 10,3 |
| | 50-74 ans | 20,3 | 21,6 | 18,8 | 31,8 | 27,7 | 18,4 | 16,4 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 92,9 | 97,1 | 86,4 | 100 | 83,3 | 95 | 90 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 97,7 | 98 | 97,3 | 100 | 100 | 97,6 | 97,1 |
| | 65-69 ans | 97,7 | 96 | 100 | 85,7 | 100 | 97,7 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 97,8 | 98,1 | 97,5 | 97,5 | 92,6 | 98,2 | 98,5 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 57,1 | 55,9 | 59,1 | 57,1 | 41,7 | 55 | 80 |
| | 55-59 ans | 46 | 28,6 | 67,9 | 0 | 75 | 32,3 | 66,7 |
| | 60-64 ans | 57 | 49 | 67,6 | 50 | 100 | 48,8 | 65,7 |
| | 65-69 ans | 35,2 | 28 | 44,7 | 14,3 | 75 | 30,2 | 41,2 |
| | 70-74 ans | 57,1 | 51,3 | 63,2 | 85,7 | 50 | 43,8 | 65,6 |
| | 50-74 ans | 50 | 42 | 60,1 | 47,5 | 57,1 | 40,7 | 60,7 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 1,8 | 0 | 4,5 | 0 | 8,3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,3 | 5,7 | 7,1 | 0 | 25 | 6,5 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2,3 | 2 | 2,6 | 0 | 0 | 2,3 | 2,9 |
| | 70-74 ans | 1,3 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 0 | 7,1 | 2,4 | 1,5 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 17,9 | 17,6 | 18,2 | 7,1 | 25 | 25 | 10 |
| | 55-59 ans | 17,5 | 22,9 | 10,7 | 0 | 0 | 25,8 | 12,5 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 70 - Haute-Saône

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial ^s | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 22,1 | 26,5 | 16,2 | 37,5 | 0 | 24,4 | 17,1 |
| | 65-69 ans | 22,7 | 22 | 23,7 | 14,3 | 0 | 23,3 | 26,5 |
| | 70-74 ans | 10,4 | 17,9 | 2,6 | 0 | 0 | 21,9 | 3,1 |
| | 50-74 ans | 18,4 | 21,7 | 14,1 | 12,5 | 10,7 | 24 | 14,8 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 8,9 | 14,7 | 0 | 21,4 | 0 | 10 | 0 |
| | 55-59 ans | 12,7 | 22,9 | 0 | 75 | 0 | 16,1 | 0 |
| | 60-64 ans | 5,8 | 8,2 | 2,7 | 0 | 0 | 9,8 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 22,7 | 28 | 15,8 | 14,3 | 0 | 30,2 | 17,6 |
| | 70-74 ans | 15,6 | 17,9 | 13,2 | 14,3 | 0 | 18,8 | 15,6 |
| | 50-74 ans | 13,5 | 18,4 | 7,4 | 20 | 0 | 18 | 8,9 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 25 | 0 | 6,5 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 5,8 | 4,1 | 8,1 | 12,5 | 0 | 2,4 | 8,6 |
| | 65-69 ans | 10,2 | 10 | 10,5 | 28,6 | 25 | 7 | 8,8 |
| | 70-74 ans | 7,8 | 2,6 | 13,2 | 0 | 33,3 | 3,1 | 9,4 |
| | 50-74 ans | 6,5 | 5,3 | 8 | 10 | 10,7 | 4,2 | 7,4 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 0 | 0 | 9,7 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 4,1 | 2,7 | 0 | 0 | 4,9 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 2,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,9 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 0 |
| | 50-74 ans | 3,2 | 4,8 | 1,2 | 0 | 0 | 6 | 1,5 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 7,1 | 2,9 | 13,6 | 0 | 16,7 | 5 | 10 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 4,1 | 2,7 | 0 | 0 | 4,9 | 2,9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 70 - Haute-Saône

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 2,3 | 4 | 0 | 14,3 | 0 | 2,3 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 7,1 | 2,4 | 1,5 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,5 | 5,5 | 1,7 | 3,5 | 2,4 | 8,3 | 1 |
| | 55-59 ans | 4,7 | 8,7 | 1,3 | 9,6 | 0 | 8,6 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 4,9 | 7,6 | 2,6 | 8,7 | 0 | 7,4 | 3 |
| | 65-69 ans | 9,6 | 12,5 | 6,9 | 8,1 | 0 | 13,1 | 7,6 |
| | 70-74 ans | 6,9 | 10,4 | 3,9 | 7,6 | 0 | 10,7 | 4,3 |
| | 50-74 ans | 5,8 | 8,8 | 3,2 | 6 | 1,3 | 9,6 | 3,7 |
| | 50-74 ans ** | 5,6 | 8,5 | 2,9 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,2 | 2,5 | 0 | 2,6 | 0 | 2,4 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 4,4 | 0 | 9,6 | 0 | 3,3 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 0,4 |
| | 65-69 ans | 4,8 | 7 | 2,7 | 4,1 | 0 | 7,4 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 4,2 | 5,2 | 3,3 | 7,6 | 0 | 4,9 | 3,6 |
| | 50-74 ans | 2,4 | 4 | 1,1 | 3,7 | 0 | 4,1 | 1,4 |
| | 50-74 ans ** | 2,3 | 3,8 | 1 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,9 | 2 | 0 | 1,7 | 0 | 2,4 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,5 | 3,3 | 0 | 9,6 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 0,4 |
| | 65-69 ans | 3,6 | 6 | 1,4 | 0 | 0 | 6,8 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 4,2 | 5,2 | 3,3 | 7,6 | 0 | 4,9 | 3,6 |
| | 50-74 ans | 2 | 3,5 | 0,8 | 2,8 | 0 | 3,7 | 1 |
| | 50-74 ans ** | 2 | 3,3 | 0,8 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,9 | 2 | 0 | 1,7 | 0 | 2,4 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 3,8 | 0 | 9,6 | 0 | 2,6 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 2,5 | 0,4 | 2,9 | 0 | 2,5 | 0,4 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 7,5 | 3,2 | 4,1 | 0 | 8 | 3,6 |
| | 70-74 ans | 4,8 | 6,7 | 3,3 | 7,6 | 0 | 6,6 | 3,6 |
| | 50-74 ans | 2,6 | 4,3 | 1,2 | 3,7 | 0 | 4,5 | 1,5 |
| | 50-74 ans ** | 2,5 | 4 | 1,1 | - | - | - | - |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 70 - Haute-Saône

| Indicateurs sur la période 2013-2014 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1,6 | 0,4 | 3,2 | 0 | 1,3 | 0,5 |
| | 60-64 ans | 1 | 0,8 | 1,1 | 2,9 | 0 | 0,5 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 8,1 | 4,6 | 1,7 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 2,1 | 0,7 | 3,3 | 0 | 13,2 | 0,8 | 2,2 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 1 | 1,2 |
| | 50-74 ans ** | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)