

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	841	393	448	229	262	164	186
	55-59 ans	808	343	465	90	88	253	377
	60-64 ans	1 112	500	612	112	99	388	513
	65-69 ans	980	418	562	67	79	351	483
	70-74 ans	681	305	376	53	66	252	310
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 422</b>	<b>1 959</b>	<b>2 463</b>	<b>551</b>	<b>594</b>	<b>1 408</b>	<b>1 869</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	57	27	30	18	18	9	12
	55-59 ans	58	26	32	10	11	16	21
	60-64 ans	66	37	29	13	7	24	22
	65-69 ans	71	28	43	5	12	23	31
	70-74 ans	60	36	24	15	12	21	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>312</b>	<b>154</b>	<b>158</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>93</b>	<b>98</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	35	18	17	11	11	7	6
	55-59 ans	42	20	22	6	5	14	17
	60-64 ans	42	25	17	5	3	20	14
	65-69 ans	58	25	33	3	8	22	25
	70-74 ans	47	29	18	11	8	18	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>224</b>	<b>117</b>	<b>107</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>81</b>	<b>72</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	22	9	13	7	7	2	6
	55-59 ans	16	6	10	4	6	2	4
	60-64 ans	24	12	12	8	4	4	8
	65-69 ans	13	3	10	2	4	1	6
	70-74 ans	13	7	6	4	4	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>26</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	819	384	435	222	255	162	180
	55-59 ans	792	337	455	86	82	251	373
	60-64 ans	1 088	488	600	104	95	384	505
	65-69 ans	967	415	552	65	75	350	477
	70-74 ans	668	298	370	49	62	249	308
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 334</b>	<b>1 922</b>	<b>2 412</b>	<b>526</b>	<b>569</b>	<b>1 396</b>	<b>1 843</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	21	7	14	5	11	2	3
	55-59 ans	17	11	6	1	2	10	4
	60-64 ans	33	14	19	2	4	12	15
	65-69 ans	20	9	11	1	1	8	10
	70-74 ans	19	11	8	1	2	10	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>38</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	21	7	14	5	11	2	3
	55-59 ans	17	11	6	1	2	10	4
	60-64 ans	33	14	19	2	4	12	15
	65-69 ans	20	9	11	1	1	8	10
	70-74 ans	19	11	8	1	2	10	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>38</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	11	5	6	4	4	1	2
	55-59 ans	12	8	4	0	1	8	3
	60-64 ans	19	6	13	1	2	5	11
	65-69 ans	18	8	10	1	1	7	9
	70-74 ans	13	5	8	0	2	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>31</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	9	3	6	3	4	0	2
	55-59 ans	12	8	4	0	1	8	3
	60-64 ans	19	6	13	1	2	5	11
	65-69 ans	17	8	9	1	1	7	8
	70-74 ans	11	4	7	0	1	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	10	4	6	4	4	0	2
	55-59 ans	12	8	4	0	1	8	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19	6	13	1	2	5	11
	65-69 ans	18	8	10	1	1	7	9
	70-74 ans	12	4	8	0	2	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>31</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	10	4	6	3	4	1	2
	55-59 ans	12	8	4	0	1	8	3
	60-64 ans	19	6	13	1	2	5	11
	65-69 ans	17	8	9	1	1	7	8
	70-74 ans	12	4	8	0	2	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	11	5	6	4	4	1	2
	55-59 ans	12	8	4	0	1	8	3
	60-64 ans	19	6	13	1	2	5	11
	65-69 ans	18	8	10	1	1	7	9
	70-74 ans	13	5	8	0	2	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>31</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	8	3	5	3	3	0	2
	55-59 ans	9	5	4	0	1	5	3
	60-64 ans	14	2	12	0	2	2	10
	65-69 ans	9	4	5	1	1	3	4
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>22</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 48 - Lozère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	0	7	0	6	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	9	5	4	0	1	5	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	6,9	6,7	7,9	6,9	5,5	6,5
	55-59 ans	7,2	7,6	6,9	11,1	12,5	6,3	5,6
	60-64 ans	5,9	7,4	4,7	11,6	7,1	6,2	4,3
	65-69 ans	7,2	6,7	7,7	7,5	15,2	6,6	6,4
	70-74 ans	8,8	11,8	6,4	28,3	18,2	8,3	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>7,9</b>	<b>6,4</b>	<b>11,1</b>	<b>10,1</b>	<b>6,6</b>	<b>5,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,6	2,3	2,9	3,1	2,7	1,2	3,2
	55-59 ans	2	1,7	2,2	4,4	6,8	0,8	1,1
	60-64 ans	2,2	2,4	2	7,1	4	1	1,6
	65-69 ans	1,3	0,7	1,8	3	5,1	0,3	1,2
	70-74 ans	1,9	2,3	1,6	7,5	6,1	1,2	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,4	66,7	56,7	61,1	61,1	77,8	50
	55-59 ans	72,4	76,9	68,8	60	45,5	87,5	81
	60-64 ans	63,6	67,6	58,6	38,5	42,9	83,3	63,6
	65-69 ans	81,7	89,3	76,7	60	66,7	95,7	80,6
	70-74 ans	78,3	80,6	75	73,3	66,7	85,7	83,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,8</b>	<b>76</b>	<b>67,7</b>	<b>59</b>	<b>58,3</b>	<b>87,1</b>	<b>73,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	1,8	3,2	2,3	4,3	1,2	1,7
	55-59 ans	2,1	3,3	1,3	1,2	2,4	4	1,1
	60-64 ans	3	2,9	3,2	1,9	4,2	3,1	3
	65-69 ans	2,1	2,2	2	1,5	1,3	2,3	2,1
	70-74 ans	2,8	3,7	2,2	2	3,2	4	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3</b>	<b>2,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	52,4	71,4	42,9	80	36,4	50	66,7
	55-59 ans	70,6	72,7	66,7	0	50	80	75

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	57,6	42,9	68,4	50	50	41,7	73,3
	65-69 ans	90	88,9	90,9	100	100	87,5	90
	70-74 ans	68,4	45,5	100	0	100	50	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>66,4</b>	<b>61,5</b>	<b>70,7</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>61,9</b>	<b>81,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	81,8	60	100	75	100	0	100
	55-59 ans	100	100	100	0	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	94,4	100	90	100	100	100	88,9
	70-74 ans	84,6	80	87,5	0	50	80	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,2</b>	<b>90,6</b>	<b>95,1</b>	<b>83,3</b>	<b>90</b>	<b>92,3</b>	<b>96,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0,5 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-2)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-2)	0 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-2)
	65-69 ans	1 (0-2)	0 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-2)	0 (0-2)	0 (0-1)	1 (0-2)
	70-74 ans	1 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-2)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (0-1)</b>	<b>1 (0-1)</b>	<b>1 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>1 (0-1)</b>	<b>1 (0-2)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54	44	63	47	71	33	47
	55-59 ans	63	63	62	,	62	63	62
	60-64 ans	69	73	67	52	76	78	65
	65-69 ans	61	47	73	12	147	51	65
	70-74 ans	45	50	42	,	18	50	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	47 (33-61)	43 (40-47)	60,5 (32-89)	45 (41,5-52)	74,5 (46-96,5)	33 (33-33)	46,5 (32-61)
	55-59 ans	52 (33-76,5)	41,5 (24,5-102,5)	63 (51,5-72,5)		62 (62-62)	41,5 (24,5-102,5)	64 (41-81)
	60-64 ans	57 (43-79)	53,5 (38-90)	64 (46-73)	52 (52-52)	76 (73-79)	55 (38-90)	57 (43-70)
	65-69 ans	62 (27-86)	36 (25,5-70)	66,5 (42-106)	12 (12-12)	147 (147-147)	43 (27-79)	64 (42-86)
	70-74 ans	46 (27,5-62,5)	53 (28-67)	39 (18-58)		18 (18-18)	53 (28-67)	47,5 (29-58)
	<b>50-74 ans</b>	<b>56 (32,5-74)</b>	<b>43 (27,5-69,5)</b>	<b>61,5 (40-77,5)</b>	<b>45 (40-52)</b>	<b>73 (60-89)</b>	<b>42,5 (27-75)</b>	<b>58 (39-70)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	33,3	0	50	0	54,5	0	33,3
	55-59 ans	17,6	18,2	16,7	100	0	10	25
	60-64 ans	27,3	35,7	21,1	0	25	41,7	20
	65-69 ans	5	11,1	0	0	0	12,5	0
	70-74 ans	21,1	36,4	0	100	0	30	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,8</b>	<b>23,1</b>	<b>20,7</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>23,8</b>	<b>13,2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	90,9	80	100	75	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	0	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	94,4	100	90	100	100	100	88,9
	70-74 ans	92,3	80	100	0	100	80	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,9</b>	<b>93,8</b>	<b>97,6</b>	<b>83,3</b>	<b>100</b>	<b>96,2</b>	<b>96,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	72,7	60	83,3	75	75	0	100
	55-59 ans	75	62,5	100	0	100	62,5	100
	60-64 ans	73,7	33,3	92,3	0	100	40	90,9
	65-69 ans	50	50	50	100	100	42,9	44,4
	70-74 ans	38,5	20	50	0	50	20	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>61,6</b>	<b>46,9</b>	<b>73,2</b>	<b>66,7</b>	<b>80</b>	<b>42,3</b>	<b>71</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,1	20	0	0	0	100	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5,6	0	10	0	0	0	11,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5,3	16,7	0	0	0	20	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,8</b>	<b>0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,1	0	16,7	0	25	0	0
	55-59 ans	8,3	12,5	0	0	0	12,5	0
	60-64 ans	5,3	16,7	0	100	0	0	0
	65-69 ans	16,7	25	10	0	0	28,6	11,1
	70-74 ans	38,5	60	25	0	0	60	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,1</b>	<b>21,9</b>	<b>9,8</b>	<b>16,7</b>	<b>10</b>	<b>23,1</b>	<b>9,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	8,3	12,5	0	0	0	12,5	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5,6	0	10	0	0	0	11,1
	70-74 ans	7,7	0	12,5	0	50	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>3,1</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	8,3	12,5	0	0	0	12,5	0
	60-64 ans	10,5	16,7	7,7	0	0	20	9,1
	65-69 ans	16,7	25	10	0	0	28,6	11,1
	70-74 ans	7,7	0	12,5	0	0	0	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,6</b>	<b>12,5</b>	<b>7,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,4</b>	<b>9,7</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	9,1	20	0	25	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5,6	0	10	0	0	0	11,1
	70-74 ans	7,7	20	0	0	0	20	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>6,3</b>	<b>2,4</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	0	2,3	0	3,9	0	0
	55-59 ans	1,3	3	0	0	0	4	0
	60-64 ans	1,8	4,1	0	9,6	0	2,6	0
	65-69 ans	3,1	4,8	1,8	0	0	5,7	2,1
	70-74 ans	7,5	10,1	5,4	0	0	12	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>5</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	0	2,3	0	3,9	0	0
	55-59 ans	1,3	3	0	0	0	4	0
	60-64 ans	0,9	2	0	9,6	0	0	0
	65-69 ans	3,1	4,8	1,8	0	0	5,7	2,1
	70-74 ans	7,5	10,1	5,4	0	0	12	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>4,3</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	0	2,3	0	3,9	0	0
	55-59 ans	1,3	3	0	0	0	4	0
	60-64 ans	0,9	2	0	9,6	0	0	0
	65-69 ans	3,1	4,8	1,8	0	0	5,7	2,1
	70-74 ans	6	10,1	2,7	0	0	12	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>4,3</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	0	2,3	0	3,9	0	0
	55-59 ans	1,3	3	0	0	0	4	0
	60-64 ans	0,9	2	0	9,6	0	0	0
	65-69 ans	3,1	4,8	1,8	0	0	5,7	2,1
	70-74 ans	6	10,1	2,7	0	0	12	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>4,3</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 48 - Lozère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	1,3	3	0	0	0	4	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	1	0	1,8	0	0	0	2,1	
	70-74 ans	1,5	0	2,7	0	16,1	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	100	100	0	0	0	100	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	100	0	100	0	0	0	100	
	70-74 ans	100	0	100	0	100	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)