

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 300	4 197	5 103	2 381	2 760	1 816	2 343
	55-59 ans	9 050	4 003	5 047	673	663	3 330	4 384
	60-64 ans	10 231	4 637	5 594	636	680	4 001	4 914
	65-69 ans	8 917	4 145	4 772	484	498	3 661	4 274
	70-74 ans	6 394	2 881	3 513	312	326	2 569	3 187
	50-74 ans	43 892	19 863	24 029	4 486	4 927	15 377	19 102
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	687	330	357	223	224	107	133
	55-59 ans	706	323	383	80	79	243	304
	60-64 ans	748	324	424	74	65	250	359
	65-69 ans	622	279	343	49	52	230	291
	70-74 ans	489	222	267	39	27	183	240
	50-74 ans	3 252	1 478	1 774	465	447	1 013	1 327
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	538	259	279	173	168	86	111
	55-59 ans	539	250	289	53	46	197	243
	60-64 ans	624	275	349	56	43	219	306
	65-69 ans	517	233	284	36	35	197	249
	70-74 ans	391	181	210	23	18	158	192
	50-74 ans	2 609	1 198	1 411	341	310	857	1 101
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	149	71	78	50	56	21	22
	55-59 ans	167	73	94	27	33	46	61
	60-64 ans	124	49	75	18	22	31	53
	65-69 ans	105	46	59	13	17	33	42
	70-74 ans	98	41	57	16	9	25	48
	50-74 ans	643	280	363	124	137	156	226
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 151	4 126	5 025	2 331	2 704	1 795	2 321
	55-59 ans	8 883	3 930	4 953	646	630	3 284	4 323
	60-64 ans	10 107	4 588	5 519	618	658	3 970	4 861
	65-69 ans	8 812	4 099	4 713	471	481	3 628	4 232
	70-74 ans	6 296	2 840	3 456	296	317	2 544	3 139
	50-74 ans	43 249	19 583	23 666	4 362	4 790	15 221	18 876
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	186	88	98	59	60	29	38
	55-59 ans	195	98	97	25	13	73	84
	60-64 ans	226	109	117	17	12	92	105
	65-69 ans	210	107	103	14	12	93	91
	70-74 ans	166	84	82	7	5	77	77

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	983	486	497	122	102	364	395
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	185	88	97	59	60	29	37
	55-59 ans	195	98	97	25	13	73	84
	60-64 ans	225	108	117	17	12	91	105
	65-69 ans	210	107	103	14	12	93	91
	70-74 ans	163	83	80	7	5	76	75
	50-74 ans	978	484	494	122	102	362	392
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	135	63	72	38	40	25	32
	55-59 ans	153	81	72	21	6	60	66
	60-64 ans	182	82	100	10	11	72	89
	65-69 ans	163	82	81	11	7	71	74
	70-74 ans	132	66	66	6	4	60	62
	50-74 ans	765	374	391	86	68	288	323
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	112	52	60	30	32	22	28
	55-59 ans	136	71	65	18	6	53	59
	60-64 ans	155	73	82	8	10	65	72
	65-69 ans	135	68	67	10	5	58	62
	70-74 ans	103	55	48	4	2	51	46
	50-74 ans	641	319	322	70	55	249	267
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	133	61	72	36	40	25	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	153	81	72	21	6	60	66
	60-64 ans	182	82	100	10	11	72	89
	65-69 ans	160	80	80	11	6	69	74
	70-74 ans	130	66	64	6	4	60	60
	50-74 ans	758	370	388	84	67	286	321
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	134	62	72	37	40	25	32
	55-59 ans	151	81	70	21	6	60	64
	60-64 ans	180	82	98	10	10	72	88
	65-69 ans	159	81	78	11	6	70	72
	70-74 ans	130	64	66	6	4	58	62
	50-74 ans	754	370	384	85	66	285	318
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	137	64	73	39	40	25	33
	55-59 ans	153	81	72	21	6	60	66
	60-64 ans	182	82	100	10	11	72	89
	65-69 ans	164	83	81	11	7	72	74
	70-74 ans	134	66	68	6	4	60	64
	50-74 ans	770	376	394	87	68	289	326
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	89	36	53	21	29	15	24
	55-59 ans	97	47	50	11	4	36	46
	60-64 ans	101	39	62	4	7	35	55
	65-69 ans	91	34	57	4	5	30	52
	70-74 ans	61	24	37	3	2	21	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	439	180	259	43	47	137	212
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	10	6	4	3	3	3	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	9	3	6	0	0	3	6
	65-69 ans	7	2	5	0	1	2	4
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	50-74 ans	38	17	21	4	5	13	16
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	13	9	4	5	2	4	2
	55-59 ans	17	8	9	1	0	7	9
	60-64 ans	14	7	7	1	1	6	6
	65-69 ans	14	10	4	1	0	9	4
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	50-74 ans	72	42	30	9	3	33	27
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	11	6	5	4	2	2	3
	55-59 ans	24	17	7	6	2	11	5
	60-64 ans	39	24	15	4	2	20	13
	65-69 ans	28	23	5	3	0	20	5
	70-74 ans	26	13	13	1	0	12	13
	50-74 ans	128	83	45	18	6	65	39
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	12	5	7	0	0	5	7
	65-69 ans	11	9	2	2	0	7	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	19	12	7	1	1	11	6
	50-74 ans	54	34	20	9	3	25	17
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	4	7	1	2	3	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	24	15	9	9	4	6	5
	55-59 ans	41	25	16	7	2	18	14
	60-64 ans	53	31	22	5	3	26	19
	65-69 ans	42	33	9	4	0	29	9
	70-74 ans	40	21	19	2	0	19	19
	50-74 ans	200	125	75	27	9	98	66
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	11	6	5	4	2	2	3
	55-59 ans	24	17	7	6	2	11	5
	60-64 ans	39	24	15	4	2	20	13
	65-69 ans	28	23	5	3	0	20	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	26	13	13	1	0	12	13
	50-74 ans	128	83	45	18	6	65	39
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	5	4	3	2	2	2
	55-59 ans	17	12	5	4	1	8	4
	60-64 ans	27	17	10	4	2	13	8
	65-69 ans	17	14	3	2	0	12	3
	70-74 ans	18	10	8	1	0	9	8
	50-74 ans	88	58	30	14	5	44	25
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	12	6	6	3	2	3	4
	55-59 ans	24	17	7	5	2	12	5
	60-64 ans	28	17	11	4	2	13	9
	65-69 ans	23	18	5	2	0	16	5
	70-74 ans	19	11	8	1	0	10	8
	50-74 ans	106	69	37	15	6	54	31
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	12	5	7	0	0	5	7
	65-69 ans	11	9	2	2	0	7	2
	70-74 ans	19	12	7	1	1	11	6
	50-74 ans	54	34	20	9	3	25	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	10	4	6	0	0	4	6
	65-69 ans	10	9	1	2	0	7	1
	70-74 ans	19	12	7	1	1	11	6
	50-74 ans	51	33	18	9	3	24	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	8	6	2	2	1	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	4	1	0	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	8	3	5	0	0	3	5
	65-69 ans	9	8	1	1	0	7	1
	70-74 ans	16	9	7	0	1	9	6
	50-74 ans	43	27	16	7	2	20	14
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	4	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	6	2	4	0	0	2	4
	65-69 ans	8	7	1	1	0	6	1
	70-74 ans	14	7	7	0	1	7	6
	50-74 ans	37	22	15	7	2	15	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	15	10	5	1	0	9	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	12	7	5	3	1	4	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	5	1	4	1	1	0	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	10	4	6	0	0	4	6
	65-69 ans	10	9	1	2	0	7	1
	70-74 ans	18	12	6	1	1	11	5
	50-74 ans	49	32	17	9	3	23	14
A40- Perdus de vue	50-54 ans	41	21	20	18	16	3	4
	55-59 ans	34	12	22	3	7	9	15
	60-64 ans	30	18	12	5	1	13	11
	65-69 ans	38	19	19	3	5	16	14
	70-74 ans	23	12	11	1	1	11	10
	50-74 ans	166	82	84	30	30	52	54

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,4	7,9	7	9,4	8,1	5,9	5,7
	55-59 ans	7,8	8,1	7,6	11,9	11,9	7,3	6,9
	60-64 ans	7,3	7	7,6	11,6	9,6	6,2	7,3
	65-69 ans	7	6,7	7,2	10,1	10,4	6,3	6,8
	70-74 ans	7,6	7,7	7,6	12,5	8,3	7,1	7,5
	50-74 ans	7,4	7,4	7,4	10,4	9,1	6,6	6,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	2,1	2	1,2	0,9
	55-59 ans	1,8	1,8	1,9	4	5	1,4	1,4
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	2,8	3,2	0,8	1,1
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	2,7	3,4	0,9	1
	70-74 ans	1,5	1,4	1,6	5,1	2,8	1	1,5
	50-74 ans	1,5	1,4	1,5	2,8	2,8	1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,3	78,5	78,2	77,6	75	80,4	83,5
	55-59 ans	76,3	77,4	75,5	66,3	58,2	81,1	79,9
	60-64 ans	83,4	84,9	82,3	75,7	66,2	87,6	85,2
	65-69 ans	83,1	83,5	82,8	73,5	67,3	85,7	85,6
	70-74 ans	80	81,5	78,7	59	66,7	86,3	80
	50-74 ans	80,2	81,1	79,5	73,3	69,4	84,6	83
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,1	2	2,5	2,2	1,6	1,6
	55-59 ans	2,2	2,5	2	3,9	2,1	2,2	1,9
	60-64 ans	2,2	2,4	2,1	2,8	1,8	2,3	2,2
	65-69 ans	2,4	2,6	2,2	3	2,5	2,6	2,2
	70-74 ans	2,6	3	2,4	2,4	1,6	3	2,5
	50-74 ans	2,3	2,5	2,1	2,8	2,1	2,4	2,1
50-74 ans **	2,3	2,5	2,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100	99	100	100	100	97,4
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	99,1	100	100	100	98,9	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,2	98,8	97,6	100	100	98,7	97,4
	50-74 ans	99,5	99,6	99,4	100	100	99,5	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	73	71,6	74,2	64,4	66,7	86,2	86,5
	55-59 ans	78,5	82,7	74,2	84	46,2	82,2	78,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	80,9	75,9	85,5	58,8	91,7	79,1	84,8
	65-69 ans	77,6	76,6	78,6	78,6	58,3	76,3	81,3
	70-74 ans	81	79,5	82,5	85,7	80	78,9	82,7
	50-74 ans	78,2	77,3	79,1	70,5	66,7	79,6	82,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	83	82,5	83,3	78,9	80	88	87,5
	55-59 ans	88,9	87,7	90,3	85,7	100	88,3	89,4
	60-64 ans	85,2	89	82	80	90,9	90,3	80,9
	65-69 ans	82,8	82,9	82,7	90,9	71,4	81,7	83,8
	70-74 ans	78	83,3	72,7	66,7	50	85	74,2
	50-74 ans	83,8	85,3	82,4	81,4	80,9	86,5	82,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80	79	81	85	74	71	89
	55-59 ans	88	91	85	101	52	87	88
	60-64 ans	73	86	62	48	62	92	63
	65-69 ans	80	87	72	77	64	88	73
	70-74 ans	87	99	75	66	79	102	75
	50-74 ans	81	88	74	82	69	90	75
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (49-91)	59,5 (50-91)	66,5 (47,5-111)	57 (49-96)	61 (45,5-83,5)	64 (53-89)	77 (53-120)
	55-59 ans	57 (42,5-79)	61 (46-82)	56 (41-74)	55 (47-82)	52 (43-68)	61 (45-82)	56 (41-74)
	60-64 ans	55 (42-77)	55 (43-87)	56 (42-71)	44 (36-56)	57 (42-92)	56 (45,5-89,5)	55 (41,5-71)
	65-69 ans	58 (39,5-86,5)	62 (40-93)	53 (39-81)	71 (29-109)	47 (29-98)	61,5 (42-93)	53 (39,5-81)
	70-74 ans	56 (38-96)	55,5 (35,5-126,5)	60 (41-88)	62,5 (38-79)	80,5 (67-91,5)	55,5 (35-140)	55 (40-85)
	50-74 ans	58 (42-85)	58 (42-91)	57 (42-81)	56 (41-83)	59 (44,5-83,5)	60 (42-93)	56 (41-81)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	22	23,9	20,4	30,5	26,7	10,3	10,5
	55-59 ans	17,4	12,2	22,7	12	53,8	12,3	17,9
	60-64 ans	13,3	16,5	10,3	29,4	8,3	14,1	10,5
	65-69 ans	18,1	17,8	18,4	21,4	41,7	17,2	15,4
	70-74 ans	13,9	14,3	13,4	14,3	20	14,3	13
	50-74 ans	16,9	16,9	16,9	16,9	24,6	29,4	14,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,4	100	97,4	100	100	100
	55-59 ans	98,7	100	97,2	100	100	100	97
	60-64 ans	98,9	100	98	100	90,9	100	98,9
	65-69 ans	97,5	98,8	96,3	100	85,7	98,6	97,3
	70-74 ans	98,5	97	100	100	100	96,7	100
	50-74 ans	98,6	98,9	98,2	98,8	97,1	99	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65	56,3	72,6	53,8	72,5	60	72,7
	55-59 ans	63,4	58	69,4	52,4	66,7	60	69,7
	60-64 ans	55,5	47,6	62	40	63,6	48,6	61,8
	65-69 ans	55,5	41	70,4	36,4	71,4	41,7	70,3
	70-74 ans	45,5	36,4	54,4	50	50	35	54,7
	50-74 ans	57	47,9	65,7	49,4	69,1	47,4	65
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,3	9,4	5,5	7,7	7,5	12	3
	55-59 ans	3,3	3,7	2,8	4,8	0	3,3	3
	60-64 ans	4,9	3,7	6	0	0	4,2	6,7
	65-69 ans	4,3	2,4	6,2	0	14,3	2,8	5,4
	70-74 ans	5,2	4,5	5,9	0	25	5	4,7
	50-74 ans	4,9	4,5	5,3	4,6	7,4	4,5	4,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,5	0	2,7	0	5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,4
	70-74 ans	0,7	1,5	0	0	0	1,7	0
	50-74 ans	0,5	0,3	0,8	0	2,9	0,3	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,5	14,1	5,5	12,8	5	16	6,1
	55-59 ans	11,1	9,9	12,5	4,8	0	11,7	13,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7,7	8,5	7	10	9,1	8,3	6,7
	65-69 ans	8,5	12	4,9	9,1	0	12,5	5,4
	70-74 ans	10,4	12,1	8,8	16,7	0	11,7	9,4
	50-74 ans	9,4	11,2	7,6	10,3	4,4	11,4	8,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	9,4	6,8	10,3	5	8	9,1
	55-59 ans	15,7	21	9,7	28,6	33,3	18,3	7,6
	60-64 ans	21,4	29,3	15	40	18,2	27,8	14,6
	65-69 ans	17,1	27,7	6,2	27,3	0	27,8	6,8
	70-74 ans	19,4	19,7	19,1	16,7	0	20	20,3
	50-74 ans	16,6	22,1	11,4	20,7	8,8	22,5	12
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	6,3	4,1	10,3	5	0	3
	55-59 ans	3,3	4,9	1,4	9,5	0	3,3	1,5
	60-64 ans	6,6	6,1	7	0	0	6,9	7,9
	65-69 ans	6,7	10,8	2,5	18,2	0	9,7	2,7
	70-74 ans	14,2	18,2	10,3	16,7	25	18,3	9,4
	50-74 ans	7	9	5,1	10,3	4,4	8,7	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	0	0	4	3
	55-59 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	1,5
	60-64 ans	1,1	2,4	0	10	0	1,4	0
	65-69 ans	0,6	1,2	0	9,1	0	0	0
	70-74 ans	1,5	1,5	1,5	0	0	1,7	1,6
	50-74 ans	1	1,3	0,8	2,3	0	1	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,6	0	2,6	0	0	0
	55-59 ans	1,3	0	2,8	0	0	0	3
	60-64 ans	1,1	0	2	0	9,1	0	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2,4	1,2	3,7	0	14,3	1,4	2,7
	70-74 ans	1,5	3	0	0	0	3,3	0
	50-74 ans	1,4	1,1	1,8	1,1	2,9	1	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,6	1,8	3,9	1,5	3,3	2,2
	55-59 ans	4,6	6,4	3,2	10,8	3,2	5,5	3,2
	60-64 ans	5,2	6,8	4	8,1	4,6	6,5	3,9
	65-69 ans	4,8	8,1	1,9	8,5	0	8	2,1
	70-74 ans	6,4	7,4	5,5	6,8	0	7,5	6,1
	50-74 ans	4,6	6,4	3,2	6,2	1,9	6,4	3,5
	50-74 ans **	4,6	6,1	3,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,5	1	1,7	0,7	1,1	1,3
	55-59 ans	2,7	4,3	1,4	9,3	3,2	3,3	1,2
	60-64 ans	3,9	5,2	2,7	6,5	3	5	2,7
	65-69 ans	3,2	5,6	1,1	6,4	0	5,5	1,2
	70-74 ans	4,1	4,6	3,8	3,4	0	4,7	4,1
	50-74 ans	3	4,2	1,9	4,1	1,3	4,3	2,1
	50-74 ans **	2,9	4	1,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,2	0,8	1,3	0,7	1,1	0,9
	55-59 ans	1,9	3,1	1	6,2	1,6	2,4	0,9
	60-64 ans	2,7	3,7	1,8	6,5	3	3,3	1,6
	65-69 ans	1,9	3,4	0,6	4,2	0	3,3	0,7
	70-74 ans	2,9	3,5	2,3	3,4	0	3,5	2,5
	50-74 ans	2	3	1,3	3,2	1	2,9	1,3
	50-74 ans **	2	2,8	1,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,5	1,2	1,3	0,7	1,7	1,7
	55-59 ans	2,7	4,3	1,4	7,7	3,2	3,7	1,2
	60-64 ans	2,8	3,7	2	6,5	3	3,3	1,9
	65-69 ans	2,6	4,4	1,1	4,2	0	4,4	1,2
	70-74 ans	3	3,9	2,3	3,4	0	3,9	2,5
	50-74 ans	2,5	3,5	1,6	3,4	1,3	3,5	1,6
	50-74 ans **	2,5	3,4	1,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1	0,6	1,7	0,7	0	0,4
	55-59 ans	0,6	1	0,2	3,1	0	0,6	0,2
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	0	0	1,3	1,4
	65-69 ans	1,2	2,2	0,4	4,2	0	1,9	0,5
	70-74 ans	3	4,2	2	3,4	3,2	4,3	1,9
	50-74 ans	1,2	1,7	0,8	2,1	0,6	1,6	0,9
	50-74 ans **	1,2	1,6	0,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	0	33,3	0	50	0	0
	55-59 ans	20	25	0	0	0	50	0
	60-64 ans	20	25	16,7	0	0	25	16,7
	65-69 ans	10	11,1	0	50	0	0	0
	70-74 ans	15,8	25	0	100	0	18,2	0
	50-74 ans	15,7	18,2	11,1	22,2	33,3	16,7	6,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)