Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépistag	e initial §	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel								
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	166 083	76 159	89 924	53 807	60 638	22 352	29 286
	55-59 ans	139 557	61 046	78 511	23 532	26 829	37 514	51 682
	60-64 ans	145 299	64 461	80 838	20 744	23 803	43 717	57 035
	65-69 ans	102 704	46 153	56 551	12 499	14 593	33 654	41 958
	70-74 ans	81 810	35 934	45 876	9 214	11 042	26 720	34 834
	50-74 ans	635 453	283 753	351 700	119 796	136 905	163 957	214 795
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	16 262	7 463	8 799	5 722	6 431	1 741	2 368
	55-59 ans	14 141	6 129	8 012	2 987	3 469	3 142	4 543
	60-64 ans	14 174	6 269	7 905	2 625	3 012	3 644	4 893
	65-69 ans	10 669	4 745	5 924	1 742	2 098	3 003	3 826
	70-74 ans	9 192	3 803	5 389	1 393	1 773	2 410	3 616
	50-74 ans	64 438	28 409	36 029	14 469	16 783	13 940	19 246
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test								
NA	50-54 ans	9 607	4 441	5 166	3 157	3 472	1 284	1 694
	55-59 ans	8 986	3 949	5 037	1 614	1 782	2 335	3 255
	60-64 ans	9 451	4 143	5 308	1 411	1 600	2 732	3 708
	65-69 ans	7 125	3 172	3 953	920	1 100	2 252	2 853
	70-74 ans	6 122	2 548	3 574	725	915	1 823	2 659
	50-74 ans	41 291	18 253	23 038	7 827	8 869	10 426	14 169
	00 14 0110					0 000	10 420	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	6 658	3 024	3 634	2 567	2 960	457	674
	55-59 ans	5 156	2 180	2 976	1 373	1 688	807	1 288
	60-64 ans	4 725	2 128	2 597	1 215	1 412	913	1 185
	65-69 ans	3 545	1 574	1 971	823	998	751	973
	70-74 ans	3 070	1 255	1 815	668	858	587	957
	50-74 ans	23 154	10 161	12 993	6 646	7 916	3 515	5 077
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	159 425	73 135	86 290	51 240	57 678	21 895	28 612
	55-59 ans	134 401	58 866	75 535	22 159	25 141	36 707	50 394
	60-64 ans	140 574	62 333	78 241	19 529	22 391	42 804	55 850
	65-69 ans	99 159	44 579	54 580	11 676	13 595	32 903	40 985
	70-74 ans	78 740	34 679	44 061	8 546	10 184	26 133	33 877
	50-74 ans	612 299	273 592	338 707	113 150	128 989	160 442	209 718
AGE Nombre de perceppes avent un test positif	50 54 000	3 114	1 654	1 462	1 222	1 022	420	424
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans 55-59 ans	2 945	1 651 1 480	1 463 1 465	1 223 670	1 032 556	428 810	431 909
	วว-ว _ี ร สกร	2 945	1 480	1 400	670	550	010	909

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépistage	e initial §	Dépistages S	ubséquents [†]
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3 334	1 698	1 636	647	518	1 051	1 118
	65-69 ans	2 548	1 335	1 213	404	366	931	847
	70-74 ans	2 299	1 144	1 155	363	307	781	848
	50-74 ans	14 240	7 308	6 932	3 307	2 779	4 001	4 153
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	3 077	1 632	1 445	1 209	1 021	423	424
	55-59 ans	2 909	1 461	1 448	660	549	801	899
	60-64 ans	3 290	1 672	1 618	638	512	1 034	1 106
	65-69 ans	2 499	1 307	1 192	399	360	908	832
	70-74 ans	2 233	1 107	1 126	349	299	758	827
	50-74 ans	14 008	7 179	6 829	3 255	2 741	3 924	4 088
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 627	1 371	1 256	996	866	375	390
, and the state of	55-59 ans	2 575	1 297	1 278	554	454	743	824
	60-64 ans	2 959	1 502	1 457	548	441	954	1 016
	65-69 ans	2 250	1 181	1 069	343	309	838	760
	70-74 ans	1 965	975	990	295	248	680	742
	50-74 ans	12 376	6 326	6 050	2 736	2 318	3 590	3 732
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2 458	1 276	1 182	925	814	351	368
, , ,	55-59 ans	2 378	1 195	1 183	512	417	683	766
	60-64 ans	2 714	1 370	1 344	490	396	880	948
	65-69 ans	2 029	1 046	983	289	281	757	702
	70-74 ans	1 785	888	897	262	219	626	678
	50-74 ans	11 364	5 775	5 589	2 478	2 127	3 297	3 462
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une								
complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	8	6	2	4	2	2	0
	55-59 ans	7	5	2	3	0	2	2
	60-64 ans	14	7	7	3	2	4	5
	65-69 ans	13	8	5	4	1	4	4
	70-74 ans	14	9	5	6	1	3	4
	50-74 ans	56	35	21	20	6	15	15
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une								
complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72								
h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8	4	4	2	2	2	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas								
d'autres examens)	50-54 ans	2 609	1 360	1 249	988	860	372	389
	55-59 ans	2 555	1 291	1 264	549	453	742	811
	60-64 ans	2 921	1 478	1 443	542	437	936	1 006
	65-69 ans	2 213	1 159	1 054	335	305	824	749
	70-74 ans	1 932	962	970	290	241	672	729
	50-74 ans	12 230	6 250	5 980	2 704	2 296	3 546	3 684
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre								
exploration colique	50-54 ans	18	11	7	8	6	3	1
<u> </u>	55-59 ans	20	6	14	5	1	1	13
	60-64 ans	38	24	14	6	4	18	10
	65-69 ans	37	22	15	8	4	14	11
	70-74 ans	33	13	20	5	7	8	13
	50-74 ans	146	76	70	32	22	44	48
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre								
que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	11	7	4	5	4	2	0
	55-59 ans	12	5	7	3	4	2	3
	60-64 ans	22	14	8	4	2	10	6
	65-69 ans	26	12	14	2	3	10	11
	70-74 ans	38	25	13	9	5	16	8
	50-74 ans	109	63	46	23	18	40	28

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B: Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012			Total		Dépistage	initial §	Dépistages Subséquents †	
_	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable								
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,8	9,8	9,8	10,6	10,6	7,8	8,1
	55-59 ans	10,1	10,0	10,2	12,7	12,9	8,4	8,8
	60-64 ans	9,8	9,7	9,8	12,7	12,7	8,3	8,6
	65-69 ans	10,4	10,3	10,5	13,9	14,4	8,9	9,1
	70-74 ans	11,2	10,6	11,7	15,1	16,1	9,0	10,4
	50-74 ans	10,1	10,0	10,2	12,1	12,3	8,5	9,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non								
suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,0	4,0	4,0	4,8	4,9	2,0	2,3
	55-59 ans	3,7	3,6	3,8	5,8	6,3	2,2	2,5
	60-64 ans	3,3	3,3	3,2	5,9	5,9	2,1	2,1
	65-69 ans	3,5	3,4	3,5	6,6	6,8	2,2	2,3
	70-74 ans	3,8	3,5	4,0	7,2	7,8	2,2	2,3 2,7
	50-74 ans	3,6	3,6	3,7	5,5	5,8	2,1	2,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un								
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,1	59,5	58,7	55,2	54,0	73,8	71,5
	55-59 ans	63,5	64,4	62,9	54,0	51,4	74,3	71,6
	60-64 ans	66,7	66,1	67,1	53,8	53,1	75,0	75,8
	65-69 ans	66,8	66,8	66,7	52,8	52,4	75,0	74,6
	70-74 ans	66,6	67,0	66,3	52,0	51,6	75,6	73,5
	50-74 ans	64,1	64,3	63,9	54,1	52,8	74,8	73,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les								
personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,0	2,3	1,7	2,4	1,8	2,0	1,5
	55-59 ans	2,2	2,5	1,9	3,0	2,2	2,2	1,8
	60-64 ans	2,4	2,7	2,1	3,3	2,3	2,5	1,8 2,0 2,1 2,5 2,0
	65-69 ans	2,6	3,0	2,2	3,5	2,7	2,8	2,1
	70-74 ans	2,9	3,3	2,6	4,2	3,0	3,0	2,5
	50-74 ans	2,3	2,7	2,0	2,9	2,2	2,5	2,0
	50-74 ans **	2,4	2,7	2,1				
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant		,	,					
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,8	98,8	98,9	98,9	98,8	98,4
	55-59 ans	98,8	98,7	98,8	98,5	98,7	98,9	98,9
	60-64 ans	98,7	98,5	98,9	98,6	98,8	98,4	98,9
	65-69 ans	98,1	97,9	98,3	98,8	98,4	97,5	98,2
	70-74 ans	97,1	96,8	97,5	96,1	97,4	97,1	97,5

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,4	98,2	98,5	98,4	98,6	98,1	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après								
un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,4	84,0	86,9	82,4	84,8	88,7	92,0
	55-59 ans	88,5	88,8	88,3	83,9	82,7	92,8	91,7
	60-64 ans	89,9	89,8	90,0	85,9	86,1	92,3	91,9
	65-69 ans	90,0	90,4	89,7	86,0	85,8	92,3	91,3
	70-74 ans	88,0	88,1	87,9	84,5	82,9	89,7	89,7
	50-74 ans	88,3	88,1	88,6	84,1	84,6	91,5	91,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie								
complète	50-54 ans	93,6	93,1	94,1	92,9	94,0	93,6	94,4
	55-59 ans	92,3	92,1	92,6	92,4	91,9	91,9	93,0
	60-64 ans	91,7	91,2	92,2	89,4	89,8	92,2	93,3
	65-69 ans	90,2	88,6	92,0	84,3	90,9	90,3	92,4
	70-74 ans	90,8	91,1	90,6	88,8	88,3	92,1	91,4
	50-74 ans	91,8	91,3	92,4	90,6	91,8	91,8	92,8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)