

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 5349 | 2498 | 2851 | 1549 | 1624 | 949 | 1227 |
| | 55-59 ans | 4629 | 2060 | 2569 | 509 | 582 | 1551 | 1987 |
| | 60-64 ans | 5373 | 2443 | 2930 | 573 | 620 | 1870 | 2310 |
| | 65-69 ans | 4269 | 1961 | 2308 | 420 | 458 | 1541 | 1850 |
| | 70-74 ans | 3188 | 1489 | 1699 | 251 | 280 | 1238 | 1419 |
| | 50-74 ans | 22808 | 10451 | 12357 | 3302 | 3564 | 7149 | 8793 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 488 | 244 | 244 | 159 | 143 | 85 | 101 |
| | 55-59 ans | 371 | 183 | 188 | 49 | 59 | 134 | 129 |
| | 60-64 ans | 445 | 216 | 229 | 65 | 54 | 151 | 175 |
| | 65-69 ans | 372 | 196 | 176 | 50 | 45 | 146 | 131 |
| | 70-74 ans | 280 | 112 | 168 | 19 | 33 | 93 | 135 |
| | 50-74 ans | 1956 | 951 | 1005 | 342 | 334 | 609 | 671 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 337 | 172 | 165 | 103 | 89 | 69 | 76 |
| | 55-59 ans | 271 | 142 | 129 | 36 | 31 | 106 | 98 |
| | 60-64 ans | 333 | 158 | 175 | 43 | 35 | 115 | 140 |
| | 65-69 ans | 261 | 134 | 127 | 29 | 26 | 105 | 101 |
| | 70-74 ans | 208 | 86 | 122 | 15 | 21 | 71 | 101 |
| | 50-74 ans | 1410 | 692 | 718 | 226 | 202 | 466 | 516 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 151 | 72 | 79 | 56 | 54 | 16 | 25 |
| | 55-59 ans | 100 | 41 | 59 | 13 | 28 | 28 | 31 |
| | 60-64 ans | 112 | 58 | 54 | 22 | 19 | 36 | 35 |
| | 65-69 ans | 111 | 62 | 49 | 21 | 19 | 41 | 30 |
| | 70-74 ans | 72 | 26 | 46 | 4 | 12 | 22 | 34 |
| | 50-74 ans | 546 | 259 | 287 | 116 | 132 | 143 | 155 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 5198 | 2426 | 2772 | 1493 | 1570 | 933 | 1202 |
| | 55-59 ans | 4529 | 2019 | 2510 | 496 | 554 | 1523 | 1956 |
| | 60-64 ans | 5261 | 2385 | 2876 | 551 | 601 | 1834 | 2275 |
| | 65-69 ans | 4158 | 1899 | 2259 | 399 | 439 | 1500 | 1820 |
| | 70-74 ans | 3116 | 1463 | 1653 | 247 | 268 | 1216 | 1385 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 22262 | 10192 | 12070 | 3186 | 3432 | 7006 | 8638 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 73 | 42 | 31 | 27 | 17 | 15 | 14 |
| | 55-59 ans | 77 | 40 | 37 | 5 | 10 | 35 | 27 |
| | 60-64 ans | 112 | 51 | 61 | 15 | 20 | 36 | 41 |
| | 65-69 ans | 91 | 48 | 43 | 15 | 13 | 33 | 30 |
| | 70-74 ans | 72 | 32 | 40 | 6 | 6 | 26 | 34 |
| | 50-74 ans | 425 | 213 | 212 | 68 | 66 | 145 | 146 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 73 | 42 | 31 | 27 | 17 | 15 | 14 |
| | 55-59 ans | 77 | 40 | 37 | 5 | 10 | 35 | 27 |
| | 60-64 ans | 112 | 51 | 61 | 15 | 20 | 36 | 41 |
| | 65-69 ans | 91 | 48 | 43 | 15 | 13 | 33 | 30 |
| | 70-74 ans | 71 | 31 | 40 | 6 | 6 | 25 | 34 |
| | 50-74 ans | 424 | 212 | 212 | 68 | 66 | 144 | 146 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 64 | 35 | 29 | 22 | 16 | 13 | 13 |
| | 55-59 ans | 58 | 28 | 30 | 4 | 7 | 24 | 23 |
| | 60-64 ans | 94 | 41 | 53 | 10 | 18 | 31 | 35 |
| | 65-69 ans | 73 | 35 | 38 | 10 | 11 | 25 | 27 |
| | 70-74 ans | 60 | 27 | 33 | 5 | 6 | 22 | 27 |
| | 50-74 ans | 349 | 166 | 183 | 51 | 58 | 115 | 125 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 59 | 32 | 27 | 21 | 15 | 11 | 12 |
| | 55-59 ans | 57 | 28 | 29 | 4 | 7 | 24 | 22 |
| | 60-64 ans | 88 | 39 | 49 | 10 | 17 | 29 | 32 |
| | 65-69 ans | 69 | 32 | 37 | 8 | 11 | 24 | 26 |
| | 70-74 ans | 56 | 25 | 31 | 5 | 5 | 20 | 26 |
| | 50-74 ans | 329 | 156 | 173 | 48 | 55 | 108 | 118 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 63 | 35 | 28 | 22 | 15 | 13 | 13 |
| | 55-59 ans | 58 | 28 | 30 | 4 | 7 | 24 | 23 |
| | 60-64 ans | 92 | 40 | 52 | 10 | 17 | 30 | 35 |
| | 65-69 ans | 72 | 34 | 38 | 9 | 11 | 25 | 27 |
| | 70-74 ans | 58 | 27 | 31 | 5 | 5 | 22 | 26 |
| | 50-74 ans | 343 | 164 | 179 | 50 | 55 | 114 | 124 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | 50-54 ans | 63 | 35 | 28 | 22 | 15 | 13 | 13 |
| | | 55-59 ans | 58 | 28 | 30 | 4 | 7 | 24 | 23 |
| | | 60-64 ans | 93 | 40 | 53 | 10 | 18 | 30 | 35 |
| | | 65-69 ans | 73 | 35 | 38 | 10 | 11 | 25 | 27 |
| | | 70-74 ans | 59 | 27 | 32 | 5 | 6 | 22 | 26 |
| | | 50-74 ans | 346 | 165 | 181 | 51 | 57 | 114 | 124 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | 50-54 ans | 64 | 35 | 29 | 22 | 16 | 13 | 13 |
| | | 55-59 ans | 58 | 28 | 30 | 4 | 7 | 24 | 23 |
| | | 60-64 ans | 94 | 41 | 53 | 10 | 18 | 31 | 35 |
| | | 65-69 ans | 73 | 35 | 38 | 10 | 11 | 25 | 27 |
| | | 70-74 ans | 61 | 28 | 33 | 5 | 6 | 23 | 27 |
| | | 50-74 ans | 350 | 167 | 183 | 51 | 58 | 116 | 125 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | 50-54 ans | 38 | 20 | 18 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| | | 55-59 ans | 34 | 17 | 17 | 2 | 4 | 15 | 13 |
| | | 60-64 ans | 45 | 12 | 33 | 0 | 12 | 12 | 21 |
| | | 65-69 ans | 31 | 12 | 19 | 3 | 4 | 9 | 15 |
| | | 70-74 ans | 29 | 10 | 19 | 0 | 4 | 10 | 15 |
| | | 50-74 ans | 177 | 71 | 106 | 14 | 33 | 57 | 73 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | 50-54 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | 55-59 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 50-74 ans | 16 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| | 50-74 ans | 30 | 17 | 13 | 7 | 8 | 10 | 5 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | 60-64 ans | 24 | 17 | 7 | 5 | 3 | 12 | 4 |
| | 65-69 ans | 17 | 11 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| | 70-74 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| | 50-74 ans | 66 | 42 | 24 | 15 | 8 | 27 | 16 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 26 | 13 | 13 | 7 | 1 | 6 | 12 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| | 60-64 ans | 31 | 21 | 10 | 7 | 5 | 14 | 5 |
| | 65-69 ans | 26 | 16 | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| | 70-74 ans | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| | 50-74 ans | 96 | 59 | 37 | 22 | 16 | 37 | 21 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | 60-64 ans | 24 | 17 | 7 | 5 | 3 | 12 | 4 |
| | 65-69 ans | 17 | 11 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| | 70-74 ans | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| | 50-74 ans | 66 | 42 | 24 | 15 | 8 | 27 | 16 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 19 | 12 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| | 65-69 ans | 15 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| | 70-74 ans | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 53 | 32 | 21 | 14 | 8 | 18 | 13 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 21 | 14 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| | 65-69 ans | 16 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| | 70-74 ans | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| | 50-74 ans | 57 | 36 | 21 | 14 | 8 | 22 | 13 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 26 | 13 | 13 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 26 | 13 | 13 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 22 | 10 | 12 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 18 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 26 | 13 | 13 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| | 60-64 ans | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| | 50-74 ans | 56 | 36 | 20 | 14 | 5 | 22 | 15 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 9,1 | 9,8 | 8,6 | 10,3 | 8,8 | 9 | 8,2 |
| | 55-59 ans | 8 | 8,9 | 7,3 | 9,6 | 10,1 | 8,6 | 6,5 |
| | 60-64 ans | 8,3 | 8,8 | 7,8 | 11,3 | 8,7 | 8,1 | 7,6 |
| | 65-69 ans | 8,7 | 10 | 7,6 | 11,9 | 9,8 | 9,5 | 7,1 |
| | 70-74 ans | 8,8 | 7,5 | 9,9 | 7,6 | 11,8 | 7,5 | 9,5 |
| | 50-74 ans | 8,6 | 9,1 | 8,1 | 10,4 | 9,4 | 8,5 | 7,6 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 3,3 | 1,7 | 2 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,6 | 4,8 | 1,8 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 3,8 | 3,1 | 1,9 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 3,2 | 2,1 | 5 | 4,1 | 2,7 | 1,6 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 4,3 | 1,8 | 2,4 |
| | 50-74 ans | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 3,7 | 2 | 1,8 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 69,1 | 70,5 | 67,6 | 64,8 | 62,2 | 81,2 | 75,2 |
| | 55-59 ans | 73 | 77,6 | 68,6 | 73,5 | 52,5 | 79,1 | 76 |
| | 60-64 ans | 74,8 | 73,1 | 76,4 | 66,2 | 64,8 | 76,2 | 80 |
| | 65-69 ans | 70,2 | 68,4 | 72,2 | 58 | 57,8 | 71,9 | 77,1 |
| | 70-74 ans | 74,3 | 76,8 | 72,6 | 78,9 | 63,6 | 76,3 | 74,8 |
| | 50-74 ans | 72,1 | 72,8 | 71,4 | 66,1 | 60,5 | 76,5 | 76,9 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 2 | 1,5 | 1 | 1,8 | 2,3 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 2 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 3,8 | 3 | 2,2 | 1,6 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,7 |
| 50-74 ans** | 1,9 | 2,1 | 1,7 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 98,6 | 96,9 | 100 | 100 | 100 | 96,2 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,8 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 99,3 | 100 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 87,7 | 83,3 | 93,5 | 81,5 | 94,1 | 86,7 | 92,9 |
| | 55-59 ans | 75,3 | 70 | 81,1 | 80 | 70 | 68,6 | 85,2 |
| | 60-64 ans | 83,9 | 80,4 | 86,9 | 66,7 | 90 | 86,1 | 85,4 |
| | 65-69 ans | 80,2 | 72,9 | 88,4 | 66,7 | 84,6 | 75,8 | 90 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 84,5 | 87,1 | 82,5 | 83,3 | 100 | 88 | 79,4 |
| | 50-74 ans | 82,3 | 78,3 | 86,3 | 75 | 87,9 | 79,9 | 85,6 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 92,2 | 91,4 | 93,1 | 95,5 | 93,8 | 84,6 | 92,3 |
| | 55-59 ans | 98,3 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 95,7 |
| | 60-64 ans | 93,6 | 95,1 | 92,5 | 100 | 94,4 | 93,5 | 91,4 |
| | 65-69 ans | 94,5 | 91,4 | 97,4 | 80 | 100 | 96 | 96,3 |
| | 70-74 ans | 93,3 | 92,6 | 93,9 | 100 | 83,3 | 90,9 | 96,3 |
| | 50-74 ans | 94,3 | 94 | 94,5 | 94,1 | 94,8 | 93,9 | 94,4 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 71 | 65 | 78 | 71 | 94 | 55 | 58 |
| | 55-59 ans | 83 | 86 | 80 | 132 | 54 | 78 | 87 |
| | 60-64 ans | 66 | 61 | 70 | 68 | 71 | 59 | 69 |
| | 65-69 ans | 64 | 62 | 66 | 53 | 79 | 66 | 60 |
| | 70-74 ans | 98 | 106 | 91 | 64 | 65 | 116 | 97 |
| | 50-74 ans | 75 | 74 | 76 | 71 | 77 | 75 | 75 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 53.5 (34-79) | 45 (32-79) 54.5 (33.5-104.5) | 62 (43-79) | 47 (32-85) | 73 (45.5-80) | 41 (34-64) | 55 (36-76) |
| | 55-59 ans | 58 (39-111) | 104.5 | 59 (42-131) | 75 (36.5-228) | 52.5 (41-65) | 54.5 (29.5-96) | 61 (42-150) |
| | 60-64 ans | 50.5 (36.5-83) | 50 (36-76) | 51 (37-84) | 39.5 (36-119) | 49 (39-72) | 54 (29-76) | 58 (37-84) |
| | 65-69 ans | 54 (39-74) | 52 (40-71) | 57.5 (37-83) | 52 (40-64) | 59 (37-109) | 52 (42-75) | 57 (35-74) |
| | 70-74 ans | 60.5 (31-108.5) | 58 (33-107) | 63 (28-110) | 58 (55-77) | 68 (22-93) | 62 (33-107) | 44 (28-112) |
| | 50-74 ans | 54 (35-85) | 51.5 (35-85) | 57.5 (36.5-84.5) | 49 (35-85) | 59 (39.5-80.5) | 53 (34-85) | 57 (35-85.5) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 11 | 14,3 | 6,5 | 18,5 | 5,9 | 6,7 | 7,1 |
| | 55-59 ans | 19,5 | 22,5 | 16,2 | 0 | 20 | 25,7 | 14,8 |
| | 60-64 ans | 9,8 | 15,7 | 4,9 | 33,3 | 5 | 8,3 | 4,9 |
| | 65-69 ans | 14,3 | 18,8 | 9,3 | 20 | 7,7 | 18,2 | 10 |
| | 70-74 ans | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,7 | 0 | 11,5 | 14,7 |
| | 50-74 ans | 13,2 | 16,9 | 9,4 | 20,6 | 7,6 | 15,2 | 10,3 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 98,4 | 100 | 96,6 | 100 | 93,8 | 100 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 98,9 | 97,6 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 98,3 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 96,3 |
| | 50-74 ans | 99,1 | 99,4 | 98,9 | 100 | 98,3 | 99,1 | 99,2 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 59,4 | 57,1 | 62,1 | 40,9 | 56,3 | 84,6 | 69,2 |
| | 55-59 ans | 58,6 | 60,7 | 56,7 | 50 | 57,1 | 62,5 | 56,5 |
| | 60-64 ans | 47,9 | 29,3 | 62,3 | 0 | 66,7 | 38,7 | 60 |
| | 65-69 ans | 42,5 | 34,3 | 50 | 30 | 36,4 | 36 | 55,6 |
| | 70-74 ans | 47,5 | 35,7 | 57,6 | 0 | 66,7 | 43,5 | 55,6 |
| | 50-74 ans | 50,6 | 42,5 | 57,9 | 27,5 | 56,9 | 49,1 | 58,4 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 7,8 | 5,7 | 10,3 | 4,5 | 12,5 | 7,7 | 7,7 |
| | 55-59 ans | 5,2 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 |
| | 60-64 ans | 3,2 | 2,4 | 3,8 | 0 | 0 | 3,2 | 5,7 |
| | 65-69 ans | 4,1 | 5,7 | 2,6 | 10 | 0 | 4 | 3,7 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 0 | 6,1 | 0 | 16,7 | 0 | 3,7 |
| | 50-74 ans | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 5,2 | 5,2 | 4 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,1 | 2,4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 7,8 | 8,6 | 6,9 | 13,6 | 6,3 | 0 | 7,7 |
| | 55-59 ans | 6,9 | 3,6 | 10 | 0 | 28,6 | 4,2 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 7,4 | 9,8 | 5,7 | 20 | 11,1 | 6,5 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 12,3 | 14,3 | 10,5 | 20 | 18,2 | 12 | 7,4 |
| | 70-74 ans | 8,2 | 14,3 | 3 | 0 | 16,7 | 17,4 | 0 |
| | 50-74 ans | 8,6 | 10,2 | 7,1 | 13,7 | 13,8 | 8,6 | 4 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 10,9 | 11,4 | 10,3 | 13,6 | 6,3 | 7,7 | 15,4 |
| | 55-59 ans | 10,3 | 10,7 | 10 | 50 | 0 | 4,2 | 13 |
| | 60-64 ans | 25,5 | 41,5 | 13,2 | 50 | 16,7 | 38,7 | 11,4 |
| | 65-69 ans | 23,3 | 31,4 | 15,8 | 30 | 36,4 | 32 | 7,4 |
| | 70-74 ans | 19,7 | 25 | 15,2 | 40 | 0 | 21,7 | 18,5 |
| | 50-74 ans | 18,9 | 25,1 | 13,1 | 29,4 | 13,8 | 23,3 | 12,8 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 4,7 | 8,6 | 0 | 13,6 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 0 | 0 | 4,2 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 10,6 | 9,8 | 11,3 | 20 | 5,6 | 6,5 | 14,3 |
| | 65-69 ans | 4,1 | 0 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 11,1 |
| | 70-74 ans | 13,1 | 17,9 | 9,1 | 40 | 0 | 13 | 11,1 |
| | 50-74 ans | 7,4 | 7,8 | 7,1 | 13,7 | 1,7 | 5,2 | 9,6 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,1 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 1,4 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,6 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 0 | 0 | 4,2 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 0 | 0 | 4 | 3,7 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 3,6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3,7 |
| | 50-74 ans | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2 | 0 | 1,7 | 2,4 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,3 | 2,9 | 1,8 | 4 | 1,3 | 1,1 | 2,5 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 2 | 2,4 | 4 | 3,6 | 1,3 | 2 |
| | 60-64 ans | 5,9 | 8,8 | 3,5 | 12,7 | 8,3 | 7,6 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 6,3 | 8,4 | 4,4 | 12,5 | 13,7 | 7,3 | 2,2 |
| | 70-74 ans | 5,5 | 7,5 | 3,6 | 8,1 | 3,7 | 7,4 | 3,6 |
| | 50-74 ans | 4,3 | 5,8 | 3,1 | 6,9 | 4,7 | 5,3 | 2,4 |
| 50-74 ans ** | 4,1 | 5,4 | 3 | . | . | . | . | |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 2 | 0,6 | 1,1 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 4 | 0 | 0,7 | 1,5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 82 - Tarn et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 4,6 | 7,1 | 2,4 | 9,1 | 5 | 6,5 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 4,1 | 5,8 | 2,7 | 7,5 | 9,1 | 5,3 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 3,9 | 4,8 | 3 | 8,1 | 0 | 4,1 | 3,6 |
| | 50-74 ans | 3 | 4,1 | 2 | 4,7 | 2,3 | 3,9 | 1,9 |
| | 50-74 ans ** | 2,8 | 3,8 | 1,9 | . | . | . | . |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1 | 1,2 | 4 | 0 | 0 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 5 | 2,4 | 9,1 | 5 | 3,8 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 3,6 | 4,7 | 2,7 | 7,5 | 9,1 | 4 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 4,1 | 1,2 | 8,1 | 0 | 3,3 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 2,4 | 3,1 | 1,7 | 4,4 | 2,3 | 2,6 | 1,5 |
| | 50-74 ans ** | 2,2 | 2,9 | 1,7 | . | . | . | . |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1 | 1,2 | 4 | 0 | 0 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 4 | 5,9 | 2,4 | 9,1 | 5 | 4,9 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 3,8 | 5,3 | 2,7 | 7,5 | 9,1 | 4,7 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 2,9 | 4,8 | 1,2 | 8,1 | 0 | 4,1 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 2,6 | 3,5 | 1,7 | 4,4 | 2,3 | 3,1 | 1,5 |
| | 50-74 ans ** | 2,4 | 3,2 | 1,7 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,6 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0,7 | 0,5 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 3,6 | 1,7 | 1,1 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 3,4 | 1,8 | 8,1 | 0 | 2,5 | 2,2 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | 1,4 |
| | 50-74 ans ** | 2,4 | 1,3 | 1 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009