

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	58 413	26 937	31 476	21 093	23 565	5 844	7 911
	55-59 ans	54 369	23 804	30 565	11 580	13 114	12 224	17 451
	60-64 ans	67 765	30 210	37 555	10 856	11 943	19 354	25 612
	65-69 ans	55 364	24 926	30 438	5 622	6 361	19 304	24 077
	70-74 ans	45 030	20 143	24 887	4 016	4 590	16 127	20 297
	50-74 ans	280 941	126 020	154 921	53 167	59 573	72 853	95 348
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 900	1 825	2 075	1 457	1 588	368	487
	55-59 ans	3 530	1 627	1 903	809	841	818	1 062
	60-64 ans	4 587	2 117	2 470	850	881	1 267	1 589
	65-69 ans	4 392	1 919	2 473	528	667	1 391	1 806
	70-74 ans	4 333	1 798	2 535	435	607	1 363	1 928
	50-74 ans	20 742	9 286	11 456	4 079	4 584	5 207	6 872
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 497	1 157	1 340	881	983	276	357
	55-59 ans	2 413	1 122	1 291	493	485	629	806
	60-64 ans	3 334	1 544	1 790	535	517	1 009	1 273
	65-69 ans	3 265	1 450	1 815	329	400	1 121	1 415
	70-74 ans	3 210	1 375	1 835	272	333	1 103	1 502
	50-74 ans	14 719	6 648	8 071	2 510	2 718	4 138	5 353
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 403	668	735	576	605	92	130
	55-59 ans	1 117	505	612	316	356	189	256
	60-64 ans	1 253	573	680	315	364	258	316
	65-69 ans	1 127	469	658	199	267	270	391
	70-74 ans	1 124	423	701	163	275	260	426
	50-74 ans	6 024	2 638	3 386	1 569	1 867	1 069	1 519
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	57 010	26 269	30 741	20 517	22 960	5 752	7 781
	55-59 ans	53 252	23 299	29 953	11 264	12 758	12 035	17 195
	60-64 ans	66 512	29 637	36 875	10 541	11 579	19 096	25 296
	65-69 ans	54 237	24 457	29 780	5 423	6 094	19 034	23 686
	70-74 ans	43 906	19 720	24 186	3 853	4 315	15 867	19 871
	50-74 ans	274 917	123 382	151 535	51 598	57 706	71 784	93 829
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	957	530	427	416	333	114	94
	55-59 ans	991	555	436	342	225	213	211
	60-64 ans	1 344	705	639	296	254	409	385

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1 100	618	482	185	111	433	371
	70-74 ans	1 052	570	482	136	116	434	366
	50-74 ans	5 444	2 978	2 466	1 375	1 039	1 603	1 427
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	940	525	415	413	322	112	93
	55-59 ans	973	546	427	336	216	210	211
	60-64 ans	1 315	688	627	288	246	400	381
	65-69 ans	1 073	602	471	176	108	426	363
	70-74 ans	1 021	552	469	130	114	422	355
	50-74 ans	5 322	2 913	2 409	1 343	1 006	1 570	1 403
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	830	464	366	359	283	105	83
	55-59 ans	850	472	378	283	185	189	193
	60-64 ans	1 175	618	557	248	214	370	343
	65-69 ans	960	536	424	151	94	385	330
	70-74 ans	902	489	413	115	93	374	320
	50-74 ans	4 717	2 579	2 138	1 156	869	1 423	1 269
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	774	432	342	333	265	99	77
	55-59 ans	800	444	356	268	173	176	183
	60-64 ans	1 084	563	521	223	197	340	324
	65-69 ans	890	502	388	139	87	363	301
	70-74 ans	806	434	372	95	80	339	292
	50-74 ans	4 354	2 375	1 979	1 058	802	1 317	1 177
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	12	7	5	3	1	4	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	826	461	365	357	283	104	82
	55-59 ans	845	467	378	280	185	187	193
	60-64 ans	1 167	614	553	247	212	367	341
	65-69 ans	951	535	416	151	93	384	323
	70-74 ans	896	487	409	114	92	373	317
	50-74 ans	4 685	2 564	2 121	1 149	865	1 415	1 256
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	8	4	4	1	2	3	2
	65-69 ans	9	1	8	0	1	1	7
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
	50-74 ans	32	15	17	7	4	8	13
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	50-74 ans	21	13	8	4	2	9	6

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,7	6,8	6,6	6,9	6,7	6,3	6,2
	55-59 ans	6,5	6,8	6,2	7,0	6,4	6,7	6,1
	60-64 ans	6,8	7,0	6,6	7,8	7,4	6,5	6,2
	65-69 ans	7,9	7,7	8,1	9,4	10,5	7,2	7,5
	70-74 ans	9,6	8,9	10,2	10,8	13,2	8,5	9,5
	50-74 ans	7,4	7,4	7,4	7,7	7,7	7,1	7,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,3	2,7	2,6	1,6	1,6
	55-59 ans	2,1	2,1	2,0	2,7	2,7	1,5	1,5
	60-64 ans	1,8	1,9	1,8	2,9	3,0	1,3	1,2
	65-69 ans	2,0	1,9	2,2	3,5	4,2	1,4	1,6
	70-74 ans	2,5	2,1	2,8	4,1	6,0	1,6	2,1
	50-74 ans	2,1	2,1	2,2	3,0	3,1	1,5	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,0	63,4	64,6	60,5	61,9	75,0	73,3
	55-59 ans	68,4	69,0	67,8	60,9	57,7	76,9	75,9
	60-64 ans	72,7	72,9	72,5	62,9	58,7	79,6	80,1
	65-69 ans	74,3	75,6	73,4	62,3	60,0	80,6	78,3
	70-74 ans	74,1	76,5	72,4	62,5	54,9	80,9	77,9
	50-74 ans	71,0	71,6	70,5	61,5	59,3	79,5	77,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2,0	1,4	2,0	1,5	2,0	1,2
	55-59 ans	1,9	2,4	1,5	3,0	1,8	1,8	1,2
	60-64 ans	2,0	2,4	1,7	2,8	2,2	2,1	1,5
	65-69 ans	2,0	2,5	1,6	3,4	1,8	2,3	1,6
	70-74 ans	2,4	2,9	2,0	3,5	2,7	2,7	1,8
	50-74 ans	2,0	2,4	1,6	2,7	1,8	2,2	1,5
50-74 ans **	2,0	2,4	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	99,1	97,2	99,3	96,7	98,2	98,9
	55-59 ans	98,2	98,4	97,9	98,2	96,0	98,6	100,0
	60-64 ans	97,8	97,6	98,1	97,3	96,9	97,8	99,0
	65-69 ans	97,5	97,4	97,7	95,1	97,3	98,4	97,8
	70-74 ans	97,1	96,8	97,3	95,6	98,3	97,2	97,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	97,8	97,8	97,7	97,7	96,8	97,9	98,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,3	88,4	88,2	86,9	87,9	93,8	89,2
	55-59 ans	87,4	86,4	88,5	84,2	85,6	90,0	91,5
	60-64 ans	89,4	89,8	88,8	86,1	87,0	92,5	90,0
	65-69 ans	89,5	89,0	90,0	85,8	87,0	90,4	90,9
	70-74 ans	88,3	88,6	88,1	88,5	81,6	88,6	90,1
	50-74 ans	88,6	88,5	88,8	86,1	86,4	90,6	90,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,3	93,1	93,4	92,8	93,6	94,3	92,8
	55-59 ans	94,1	94,1	94,2	94,7	93,5	93,1	94,8
	60-64 ans	92,3	91,1	93,5	89,9	92,1	91,9	94,5
	65-69 ans	92,7	93,7	91,5	92,1	92,6	94,3	91,2
	70-74 ans	89,4	88,8	90,1	82,6	86,0	90,6	91,3
	50-74 ans	92,3	92,1	92,6	91,5	92,3	92,6	92,8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)