

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Centre - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	38	21	17	18	13	3	4
	55-59 ans	57	36	21	12	4	24	17
	60-64 ans	77	48	29	19	11	29	18
	65-69 ans	81	54	27	20	9	34	18
	70-74 ans	85	56	29	16	7	40	22
	50-74 ans	338	215	123	85	44	130	79
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	10	3	7	2	4	1	3
	55-59 ans	14	11	3	5	0	6	3
	60-64 ans	22	14	8	6	1	8	7
	65-69 ans	19	10	9	3	2	7	7
	70-74 ans	20	12	8	3	1	9	7
	50-74 ans	85	50	35	19	8	31	27
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	28	18	10	16	9	2	1
	55-59 ans	43	25	18	7	4	18	14
	60-64 ans	55	34	21	13	10	21	11
	65-69 ans	62	44	18	17	7	27	11
	70-74 ans	65	44	21	13	6	31	15
	50-74 ans	253	165	88	66	36	99	52
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	18	13	5	12	4	1	1
	55-59 ans	35	21	14	4	3	17	11
	60-64 ans	36	21	15	8	7	13	8
	65-69 ans	45	30	15	12	5	18	10
	70-74 ans	59	41	18	12	4	29	14
	50-74 ans	193	126	67	48	23	78	44
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	10	5	5	4	5	1	0
	55-59 ans	8	4	4	3	1	1	3
	60-64 ans	19	13	6	5	3	8	3
	65-69 ans	17	14	3	5	2	9	1
	70-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
	50-74 ans	60	39	21	18	13	21	8
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	7	0	6	0	1	0
	55-59 ans	16	11	5	2	2	9	3
	60-64 ans	13	6	7	1	4	5	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Centre - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13	7	6	3	2	4	4
	70-74 ans	25	19	6	3	2	16	4
	50-74 ans	74	50	24	15	10	35	14
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	7	4	3	2	0	2	3
	65-69 ans	14	10	4	4	1	6	3
	70-74 ans	17	10	7	5	1	5	6
	50-74 ans	51	32	19	15	4	17	15
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	9	4	5	1	0	3	5
	60-64 ans	8	6	2	2	1	4	1
	65-69 ans	10	7	3	3	2	4	1
	70-74 ans	12	9	3	3	0	6	3
	50-74 ans	42	28	14	11	4	17	10
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	8	5	3	3	2	2	1
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	26	16	10	7	5	9	5

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Centre - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	26,3	14,3	41,2	11,1	30,8	33,3	75
	55-59 ans	24,6	30,6	14,3	41,7	0	25	17,6
	60-64 ans	28,6	29,2	27,6	31,6	9,1	27,6	38,9
	65-69 ans	23,5	18,5	33,3	15	22,2	20,6	38,9
	70-74 ans	23,5	21,4	27,6	18,8	14,3	22,5	31,8
	50-74 ans	25,1	23,3	28,5	22,4	18,2	23,8	34,2
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	35,7	27,8	50	25	55,6	50	0
	55-59 ans	18,6	16	22,2	42,9	25	5,6	21,4
	60-64 ans	34,5	38,2	28,6	38,5	30	38,1	27,3
	65-69 ans	27,4	31,8	16,7	29,4	28,6	33,3	9,1
	70-74 ans	9,2	6,8	14,3	7,7	33,3	6,5	6,7
	50-74 ans	23,7	23,6	23,9	27,3	36,1	21,2	15,4
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	64,3	72,2	50	75	44,4	50	100
	55-59 ans	81,4	84	77,8	57,1	75	94,4	78,6
	60-64 ans	65,5	61,8	71,4	61,5	70	61,9	72,7
	65-69 ans	72,6	68,2	83,3	70,6	71,4	66,7	90,9
	70-74 ans	90,8	93,2	85,7	92,3	66,7	93,5	93,3
	50-74 ans	76,3	76,4	76,1	72,7	63,9	78,8	84,6
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	38,9	53,8	0	50	0	100	0
	55-59 ans	45,7	52,4	35,7	50	66,7	52,9	27,3
	60-64 ans	36,1	28,6	46,7	12,5	57,1	38,5	37,5
	65-69 ans	28,9	23,3	40	25	40	22,2	40
	70-74 ans	42,4	46,3	33,3	25	50	55,2	28,6
	50-74 ans	38,3	39,7	35,8	31,3	43,5	44,9	31,8
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	33,3	23,1	60	25	50	0	100
	55-59 ans	20	23,8	14,3	25	0	23,5	18,2
	60-64 ans	19,4	19	20	25	0	15,4	37,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Centre - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	31,1	33,3	26,7	33,3	20	33,3	30
	70-74 ans	28,8	24,4	38,9	41,7	25	17,2	42,9
	50-74 ans	26,4	25,4	28,4	31,3	17,4	21,8	34,1
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	16,7	15,4	20	16,7	25	0	0
	55-59 ans	25,7	19	35,7	25	0	17,6	45,5
	60-64 ans	22,2	28,6	13,3	25	14,3	30,8	12,5
	65-69 ans	22,2	23,3	20	25	40	22,2	10
	70-74 ans	20,3	22	16,7	25	0	20,7	21,4
	50-74 ans	21,8	22,2	20,9	22,9	17,4	21,8	22,7
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	11,1	7,7	20	8,3	25	0	0
	55-59 ans	8,6	4,8	14,3	0	33,3	5,9	9,1
	60-64 ans	22,2	23,8	20	37,5	28,6	15,4	12,5
	65-69 ans	17,8	20	13,3	16,7	0	22,2	20
	70-74 ans	8,5	7,3	11,1	8,3	25	6,9	7,1
	50-74 ans	13,5	12,7	14,9	14,6	21,7	11,5	11,4

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire