

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	646	345	301	196	187	149	114
	55-59 ans	700	385	315	88	57	297	258
	60-64 ans	833	464	369	92	55	372	314
	65-69 ans	590	298	292	56	47	242	245
	70-74 ans	671	369	302	70	37	299	265
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 440</b>	<b>1 861</b>	<b>1 579</b>	<b>502</b>	<b>383</b>	<b>1 359</b>	<b>1 196</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	653	350	303	199	189	151	114
	55-59 ans	703	386	317	88	57	298	260
	60-64 ans	840	469	371	92	56	377	315
	65-69 ans	602	305	297	56	49	249	248
	70-74 ans	687	375	312	73	38	302	274
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 485</b>	<b>1 885</b>	<b>1 600</b>	<b>508</b>	<b>389</b>	<b>1 377</b>	<b>1 211</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	381	183	198	102	125	81	73
	55-59 ans	360	161	199	38	30	123	169
	60-64 ans	405	174	231	32	34	142	197
	65-69 ans	282	111	171	27	32	84	139
	70-74 ans	312	150	162	22	14	128	148
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 740</b>	<b>779</b>	<b>961</b>	<b>221</b>	<b>235</b>	<b>558</b>	<b>726</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	26	13	13	9	6	4	7
	55-59 ans	22	16	6	3	2	13	4
	60-64 ans	29	19	10	4	0	15	10
	65-69 ans	18	9	9	2	1	7	8
	70-74 ans	18	7	11	4	1	3	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>64</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>39</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	55	28	27	12	14	16	13
	55-59 ans	86	58	28	14	6	44	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	60-64 ans	74	52	22	9	4	43	18
	65-69 ans	76	40	36	7	6	33	30
	70-74 ans	86	44	42	9	6	35	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>377</b>	<b>222</b>	<b>155</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>171</b>	<b>119</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	122	84	38	47	26	37	12
	55-59 ans	140	95	45	24	10	71	35
	60-64 ans	189	133	56	29	7	104	49
	65-69 ans	133	85	48	17	3	68	45
	70-74 ans	134	92	42	14	5	78	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>718</b>	<b>489</b>	<b>229</b>	<b>131</b>	<b>51</b>	<b>358</b>	<b>178</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	23	17	6	12	4	5	2
	55-59 ans	56	34	22	4	5	30	17
	60-64 ans	88	55	33	14	7	41	26
	65-69 ans	54	38	16	2	4	36	12
	70-74 ans	89	57	32	19	7	38	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>310</b>	<b>201</b>	<b>109</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>150</b>	<b>82</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	6	3	4	2	2	1
	55-59 ans	9	6	3	1	1	5	2
	60-64 ans	17	12	5	1	2	11	3
	65-69 ans	9	8	1	1	1	7	0
	70-74 ans	21	11	10	2	2	9	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>14</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7	4	3	2	2	2	1
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	7	5	2	1	1	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	7	3	4	2	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	177	112	65	59	40	53	25
	55-59 ans	226	153	73	38	16	115	57
	60-64 ans	263	185	78	38	11	147	67
	65-69 ans	209	125	84	24	9	101	75
	70-74 ans	221	137	84	23	11	114	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 096</b>	<b>712</b>	<b>384</b>	<b>182</b>	<b>87</b>	<b>530</b>	<b>297</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	122	84	38	47	26	37	12
	55-59 ans	140	95	45	24	10	71	35
	60-64 ans	189	133	56	29	7	104	49
	65-69 ans	133	85	48	17	3	68	45
	70-74 ans	134	92	42	14	5	78	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>718</b>	<b>489</b>	<b>229</b>	<b>131</b>	<b>51</b>	<b>358</b>	<b>178</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	91	65	26	37	18	28	8
	55-59 ans	107	71	36	21	9	50	27
	60-64 ans	141	103	38	23	6	80	32
	65-69 ans	95	62	33	13	3	49	30
	70-74 ans	100	74	26	11	1	63	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>534</b>	<b>375</b>	<b>159</b>	<b>105</b>	<b>37</b>	<b>270</b>	<b>122</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	23	17	6	12	4	5	2
	55-59 ans	56	34	22	4	5	30	17
	60-64 ans	89	56	33	14	7	42	26
	65-69 ans	54	38	16	2	4	36	12
	70-74 ans	90	58	32	19	7	39	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>312</b>	<b>203</b>	<b>109</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>152</b>	<b>82</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	99,4	99,3	99,5	98,9	99,3	100,0
	55-59 ans	99,9	99,7	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0
	60-64 ans	99,5	99,4	99,7	100,0	98,2	99,2	100,0
	65-69 ans	99,2	98,7	99,7	100,0	100,0	98,4	99,6
	70-74 ans	99,3	99,7	98,7	98,6	97,4	100,0	98,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,4</b>	<b>99,5</b>	<b>99,6</b>	<b>99,0</b>	<b>99,3</b>	<b>99,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,3	52,3	65,3	51,3	66,1	53,6	64,0
	55-59 ans	51,2	41,7	62,8	43,2	52,6	41,3	65,0
	60-64 ans	48,2	37,1	62,3	34,8	60,7	37,7	62,5
	65-69 ans	46,8	36,4	57,6	48,2	65,3	33,7	56,0
	70-74 ans	45,4	40,0	51,9	30,1	36,8	42,4	54,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>49,9</b>	<b>41,3</b>	<b>60,1</b>	<b>43,5</b>	<b>60,4</b>	<b>40,5</b>	<b>60,0</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,0	3,7	4,3	4,5	3,2	2,6	6,1
	55-59 ans	3,1	4,1	1,9	3,4	3,5	4,4	1,5
	60-64 ans	3,5	4,1	2,7	4,3	0,0	4,0	3,2
	65-69 ans	3,0	3,0	3,0	3,6	2,0	2,8	3,2
	70-74 ans	2,6	1,9	3,5	5,5	2,6	1,0	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>4,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,3	0,7	0,5	1,1	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,5	0,6	1,1	0,0	0,3	0,8
	60-64 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	1,8	0,0	0,0
	65-69 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,4	8,0	8,9	6,0	7,4	10,6	11,4
	55-59 ans	12,2	15,0	8,8	15,9	10,5	14,8	8,5
	60-64 ans	8,8	11,1	5,9	9,8	7,1	11,4	5,7
	65-69 ans	12,6	13,1	12,1	12,5	12,2	13,3	12,1
	70-74 ans	12,5	11,7	13,5	12,3	15,8	11,6	13,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,8</b>	<b>11,8</b>	<b>9,7</b>	<b>10,0</b>	<b>9,3</b>	<b>12,4</b>	<b>9,8</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	18,7	24,0	12,5	23,6	13,8	24,5	10,5
	55-59 ans	19,9	24,6	14,2	27,3	17,5	23,8	13,5
	60-64 ans	22,5	28,4	15,1	31,5	12,5	27,6	15,6
	65-69 ans	22,1	27,9	16,2	30,4	6,1	27,3	18,1
	70-74 ans	19,5	24,5	13,5	19,2	13,2	25,8	13,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,6</b>	<b>25,9</b>	<b>14,3</b>	<b>25,8</b>	<b>13,1</b>	<b>26,0</b>	<b>14,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	4,9	2,0	6,0	2,1	3,3	1,8
	55-59 ans	8,0	8,8	6,9	4,5	8,8	10,1	6,5
	60-64 ans	10,5	11,7	8,9	15,2	12,5	10,9	8,3
	65-69 ans	9,0	12,5	5,4	3,6	8,2	14,5	4,8
	70-74 ans	13,0	15,2	10,3	26,0	18,4	12,6	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,9</b>	<b>10,7</b>	<b>6,8</b>	<b>10,0</b>	<b>6,9</b>	<b>10,9</b>	<b>6,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,4
	60-64 ans	0,2	0,4	0,0	1,1	0,0	0,3	0,0
	65-69 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	2,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	1,7	1,0	2,0	1,1	1,3	0,9
	55-59 ans	1,3	1,6	0,9	1,1	1,8	1,7	0,8
	60-64 ans	2,0	2,6	1,3	1,1	3,6	2,9	1,0
	65-69 ans	1,5	2,6	0,3	1,8	2,0	2,8	0,0
	70-74 ans	3,1	2,9	3,2	2,7	5,3	3,0	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3	0,9
	55-59 ans	0,6	0,3	0,9	0,0	1,8	0,3	0,8
	60-64 ans	0,8	1,1	0,5	1,1	1,8	1,1	0,3
	65-69 ans	1,0	1,6	0,3	0,0	0,0	2,0	0,4
	70-74 ans	1,0	0,8	1,3	2,7	2,6	0,3	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
		50-74 ans	0,9	1,0	0,8	1,0	1,3	0,9	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans								
	50-54 ans	3,8	5,2	2,6	4,6	2,8	6,1	2,3	
	55-59 ans	5,3	7,9	3,1	10,2	3,9	7,4	2,9	
	60-64 ans	5,5	8,4	3,0	10,1	2,9	8,0	3,0	
	65-69 ans	6,4	8,4	4,7	11,7	3,8	7,9	4,8	
	70-74 ans	7,2	10,0	4,9	12,8	5,4	9,5	4,8	
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>7,8</b>	<b>3,5</b>	<b>7,6</b>	<b>3,3</b>	<b>7,9</b>	<b>3,6</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,5</b>	<b>7,7</b>	<b>3,5</b>	.	.	.	.		
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans								
	50-54 ans	2,6	3,9	1,5	3,7	1,8	4,3	1,1	
	55-59 ans	3,3	4,9	1,9	6,5	2,4	4,5	1,8	
	60-64 ans	3,9	6,0	2,1	7,7	1,8	5,7	2,2	
	65-69 ans	4,1	5,7	2,7	8,3	1,3	5,3	2,9	
	70-74 ans	4,3	6,7	2,4	7,8	2,4	6,5	2,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>5,4</b>	<b>2,1</b>	<b>5,4</b>	<b>1,9</b>	<b>5,3</b>	<b>2,1</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,6</b>	<b>5,3</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.		
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans								
	50-54 ans	2,0	3,0	1,0	2,9	1,3	3,2	0,7	
	55-59 ans	2,5	3,7	1,5	5,7	2,2	3,2	1,4	
	60-64 ans	2,9	4,7	1,5	6,1	1,6	4,4	1,4	
	65-69 ans	2,9	4,2	1,9	6,3	1,3	3,8	1,9	
	70-74 ans	3,2	5,4	1,5	6,1	0,5	5,3	1,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>1,4</b>	<b>4,4</b>	<b>1,4</b>	<b>4,0</b>	<b>1,5</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>4,0</b>	<b>1,4</b>	.	.	.	.		
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans								
	50-54 ans	0,5	0,8	0,2	0,9	0,3	0,6	0,2	
	55-59 ans	1,3	1,8	0,9	1,1	1,2	1,9	0,9	
	60-64 ans	1,8	2,5	1,3	3,7	1,8	2,3	1,2	
	65-69 ans	1,7	2,6	0,9	1,0	1,7	2,8	0,8	
	70-74 ans	2,9	4,2	1,9	10,6	3,4	3,3	1,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,0</b>	.	.	.	.		

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)