

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	52 331	24 485	27 846	18 986	20 156	5 499	7 690
	55-59 ans	45 441	20 864	24 577	10 760	10 584	10 104	13 993
	60-64 ans	53 268	24 181	29 087	11 311	11 547	12 870	17 540
	65-69 ans	39 097	18 018	21 079	7 510	7 331	10 508	13 748
	70-74 ans	33 027	15 244	17 783	5 780	5 965	9 464	11 818
	<b>50-74 ans</b>	<b>223 164</b>	<b>102 792</b>	<b>120 372</b>	<b>54 347</b>	<b>55 583</b>	<b>48 445</b>	<b>64 789</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 464	1 678	1 786	1 306	1 329	372	457
	55-59 ans	2 828	1 349	1 479	720	685	629	794
	60-64 ans	3 409	1 545	1 864	737	714	808	1 150
	65-69 ans	2 701	1 210	1 491	525	543	685	948
	70-74 ans	2 564	1 085	1 479	480	539	605	940
	<b>50-74 ans</b>	<b>14 966</b>	<b>6 867</b>	<b>8 099</b>	<b>3 768</b>	<b>3 810</b>	<b>3 099</b>	<b>4 289</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 257	1 089	1 168	814	819	275	349
	55-59 ans	1 941	916	1 025	428	396	488	629
	60-64 ans	2 480	1 125	1 355	464	424	661	931
	65-69 ans	1 982	882	1 100	340	339	542	761
	70-74 ans	1 829	807	1 022	308	312	499	710
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 489</b>	<b>4 819</b>	<b>5 670</b>	<b>2 354</b>	<b>2 290</b>	<b>2 465</b>	<b>3 380</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 207	589	618	492	510	97	108
	55-59 ans	887	433	454	292	289	141	165
	60-64 ans	929	420	509	273	290	147	219
	65-69 ans	719	328	391	185	204	143	187
	70-74 ans	735	278	457	172	227	106	230
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 477</b>	<b>2 048</b>	<b>2 429</b>	<b>1 414</b>	<b>1 520</b>	<b>634</b>	<b>909</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	51 124	23 896	27 228	18 494	19 646	5 402	7 582
	55-59 ans	44 554	20 431	24 123	10 468	10 295	9 963	13 828
	60-64 ans	52 339	23 761	28 578	11 038	11 257	12 723	17 321
	65-69 ans	38 378	17 690	20 688	7 325	7 127	10 365	13 561
	70-74 ans	32 292	14 966	17 326	5 608	5 738	9 358	11 588
	<b>50-74 ans</b>	<b>218 687</b>	<b>100 744</b>	<b>117 943</b>	<b>52 933</b>	<b>54 063</b>	<b>47 811</b>	<b>63 880</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	795	408	387	327	276	81	111
	55-59 ans	852	473	379	249	198	224	181
	60-64 ans	1 043	530	513	244	238	286	275

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	901	481	420	223	158	258	262
	70-74 ans	833	412	421	186	152	226	269
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 424</b>	<b>2 304</b>	<b>2 120</b>	<b>1 229</b>	<b>1 022</b>	<b>1 075</b>	<b>1 098</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	791	406	385	325	274	81	111
	55-59 ans	848	470	378	247	198	223	180
	60-64 ans	1 039	527	512	243	238	284	274
	65-69 ans	896	476	420	219	158	257	262
	70-74 ans	820	400	420	178	151	222	269
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 394</b>	<b>2 279</b>	<b>2 115</b>	<b>1 212</b>	<b>1 019</b>	<b>1 067</b>	<b>1 096</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	603	309	294	235	195	74	99
	55-59 ans	650	364	286	181	141	183	145
	60-64 ans	831	415	416	179	177	236	239
	65-69 ans	730	383	347	166	119	217	228
	70-74 ans	673	324	349	142	122	182	227
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 487</b>	<b>1 795</b>	<b>1 692</b>	<b>903</b>	<b>754</b>	<b>892</b>	<b>938</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	532	272	260	203	171	69	89
	55-59 ans	589	332	257	158	122	174	135
	60-64 ans	754	376	378	159	160	217	218
	65-69 ans	652	339	313	144	104	195	209
	70-74 ans	606	286	320	118	107	168	213
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 133</b>	<b>1 605</b>	<b>1 528</b>	<b>782</b>	<b>664</b>	<b>823</b>	<b>864</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	5	1	0	1	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	599	307	292	234	194	73	98
	55-59 ans	647	362	285	180	140	182	145
	60-64 ans	821	409	412	178	173	231	239
	65-69 ans	718	375	343	161	119	214	224
	70-74 ans	666	320	346	140	121	180	225
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 451</b>	<b>1 773</b>	<b>1 678</b>	<b>893</b>	<b>747</b>	<b>880</b>	<b>931</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	10	6	4	1	4	5	0
	65-69 ans	12	8	4	5	0	3	4
	70-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	6	5	1	1	1	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,9	6,4	6,9	6,6	6,8	5,9
	55-59 ans	6,2	6,5	6,0	6,7	6,5	6,2	5,7
	60-64 ans	6,4	6,4	6,4	6,5	6,2	6,3	6,6
	65-69 ans	6,9	6,7	7,1	7,0	7,4	6,5	6,9
	70-74 ans	7,8	7,1	8,3	8,3	9,0	6,4	8,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,2	2,6	2,5	1,8	1,4
	55-59 ans	2,0	2,1	1,8	2,7	2,7	1,4	1,2
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	2,4	2,5	1,1	1,2
	65-69 ans	1,8	1,8	1,9	2,5	2,8	1,4	1,4
	70-74 ans	2,2	1,8	2,6	3,0	3,8	1,1	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,2	64,9	65,4	62,3	61,6	73,9	76,4
	55-59 ans	68,6	67,9	69,3	59,4	57,8	77,6	79,2
	60-64 ans	72,7	72,8	72,7	63,0	59,4	81,8	81,0
	65-69 ans	73,4	72,9	73,8	64,8	62,4	79,1	80,3
	70-74 ans	71,3	74,4	69,1	64,2	57,9	82,5	75,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,1</b>	<b>70,2</b>	<b>70,0</b>	<b>62,5</b>	<b>60,1</b>	<b>79,5</b>	<b>78,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,4	1,8	1,4	1,5	1,5
	55-59 ans	1,9	2,3	1,6	2,4	1,9	2,2	1,3
	60-64 ans	2,0	2,2	1,8	2,2	2,1	2,2	1,6
	65-69 ans	2,3	2,7	2,0	3,0	2,2	2,5	1,9
	70-74 ans	2,6	2,8	2,4	3,3	2,6	2,4	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,5	99,5	99,4	99,3	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	99,4	99,7	99,2	100,0	99,6	99,4
	60-64 ans	99,6	99,4	99,8	99,6	100,0	99,3	99,6
	65-69 ans	99,4	99,0	100,0	98,2	100,0	99,6	100,0
	70-74 ans	98,4	97,1	99,8	95,7	99,3	98,2	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>98,9</b>	<b>99,8</b>	<b>98,6</b>	<b>99,7</b>	<b>99,3</b>	<b>99,8</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	76,2	76,1	76,4	72,3	71,2	91,4	89,2
	55-59 ans	76,7	77,4	75,7	73,3	71,2	82,1	80,6
	60-64 ans	80,0	78,7	81,3	73,7	74,4	83,1	87,2
	65-69 ans	81,5	80,5	82,6	75,8	75,3	84,4	87,0
	70-74 ans	82,1	81,0	83,1	79,8	80,8	82,0	84,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,4</b>	<b>78,8</b>	<b>80,0</b>	<b>74,5</b>	<b>74,0</b>	<b>83,6</b>	<b>85,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,2	88,0	88,4	86,4	87,7	93,2	89,9
	55-59 ans	90,6	91,2	89,9	87,3	86,5	95,1	93,1
	60-64 ans	90,7	90,6	90,9	88,8	90,4	91,9	91,2
	65-69 ans	89,3	88,5	90,2	86,7	87,4	89,9	91,7
	70-74 ans	90,0	88,3	91,7	83,1	87,7	92,3	93,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,8</b>	<b>89,4</b>	<b>90,3</b>	<b>86,6</b>	<b>88,1</b>	<b>92,3</b>	<b>92,1</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)