

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	32 643	14 819	17 824	10 838	12 472	3 981	5 352
	55-59 ans	30 202	13 182	17 020	4 756	5 644	8 426	11 376
	60-64 ans	37 473	16 594	20 879	4 290	4 985	12 304	15 894
	65-69 ans	30 526	14 038	16 488	3 076	3 150	10 962	13 338
	70-74 ans	25 896	11 953	13 943	2 230	2 554	9 723	11 389
	50-74 ans	156 740	70 586	86 154	25 190	28 805	45 396	57 349
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 542	722	820	578	634	144	186
	55-59 ans	1 440	685	755	363	322	322	433
	60-64 ans	1 722	781	941	276	339	505	602
	65-69 ans	1 632	716	916	201	243	515	673
	70-74 ans	1 783	774	1 009	194	269	580	740
	50-74 ans	8 119	3 678	4 441	1 612	1 807	2 066	2 634
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 118	531	587	409	435	122	152
	55-59 ans	1 060	482	578	237	220	245	358
	60-64 ans	1 351	615	736	199	221	416	515
	65-69 ans	1 342	600	742	157	171	443	571
	70-74 ans	1 391	617	774	140	175	477	599
	50-74 ans	6 262	2 845	3 417	1 142	1 222	1 703	2 195
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	424	191	233	169	199	22	34
	55-59 ans	380	203	177	126	102	77	75
	60-64 ans	371	166	205	77	118	89	87
	65-69 ans	290	116	174	44	72	72	102
	70-74 ans	392	157	235	54	94	103	141
	50-74 ans	1 857	833	1 024	470	585	363	439
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	32 219	14 628	17 591	10 669	12 273	3 959	5 318
	55-59 ans	29 822	12 979	16 843	4 630	5 542	8 349	11 301
	60-64 ans	37 102	16 428	20 674	4 213	4 867	12 215	15 807
	65-69 ans	30 236	13 922	16 314	3 032	3 078	10 890	13 236
	70-74 ans	25 504	11 796	13 708	2 176	2 460	9 620	11 248
	50-74 ans	154 883	69 753	85 130	24 720	28 220	45 033	56 910
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	916	510	406	380	300	130	106
	55-59 ans	856	467	389	201	138	266	251
	60-64 ans	1 092	573	519	155	131	418	388

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	980	545	435	133	102	412	333
	70-74 ans	933	476	457	111	79	365	378
	50-74 ans	4 777	2 571	2 206	980	750	1 591	1 456
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	903	501	402	373	298	128	104
	55-59 ans	833	453	380	193	135	260	245
	60-64 ans	1 073	563	510	147	128	416	382
	65-69 ans	957	537	420	131	96	406	324
	70-74 ans	907	464	443	106	72	358	371
	50-74 ans	4 673	2 518	2 155	950	729	1 568	1 426
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	783	427	356	321	264	106	92
	55-59 ans	695	380	315	152	110	228	205
	60-64 ans	917	485	432	125	104	360	328
	65-69 ans	831	468	363	117	80	351	283
	70-74 ans	771	402	369	87	55	315	314
	50-74 ans	3 997	2 162	1 835	802	613	1 360	1 222
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	696	385	311	288	227	97	84
	55-59 ans	614	332	282	130	97	202	185
	60-64 ans	826	445	381	114	87	331	294
	65-69 ans	711	401	310	97	68	304	242
	70-74 ans	674	357	317	79	44	278	273
	50-74 ans	3 521	1 920	1 601	708	523	1 212	1 078
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	5	4	1	3	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	7	4	6	1	1	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	1	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	781	427	354	321	262	106	92
	55-59 ans	687	377	310	151	109	226	201
	60-64 ans	914	482	432	124	104	358	328
	65-69 ans	821	463	358	115	80	348	278
	70-74 ans	765	399	366	86	54	313	312
	50-74 ans	3 968	2 148	1 820	797	609	1 351	1 211
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	8	3	5	1	1	2	4
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	10	5	5	2	0	3	5
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	50-74 ans	29	14	15	5	4	9	11
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	7	4	1	1	6	3

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	4,9	4,6	5,3	5,1	3,6	3,5
	55-59 ans	4,8	5,2	4,4	7,6	5,7	3,8	3,8
	60-64 ans	4,6	4,7	4,5	6,4	6,8	4,1	3,8
	65-69 ans	5,3	5,1	5,6	6,5	7,7	4,7	5,0
	70-74 ans	6,9	6,5	7,2	8,7	10,5	6,0	6,5
	50-74 ans	5,2	5,2	5,2	6,4	6,3	4,6	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	0,6	0,6
	55-59 ans	1,3	1,5	1,0	2,6	1,8	0,9	0,7
	60-64 ans	1,0	1,0	1,0	1,8	2,4	0,7	0,5
	65-69 ans	1,0	0,8	1,1	1,4	2,3	0,7	0,8
	70-74 ans	1,5	1,3	1,7	2,4	3,7	1,1	1,2
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	1,9	2,0	0,8	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,5	73,5	71,6	70,8	68,6	84,7	81,7
	55-59 ans	73,6	70,4	76,6	65,3	68,3	76,1	82,7
	60-64 ans	78,5	78,7	78,2	72,1	65,2	82,4	85,5
	65-69 ans	82,2	83,8	81,0	78,1	70,4	86,0	84,8
	70-74 ans	78,0	79,7	76,7	72,2	65,1	82,2	80,9
	50-74 ans	77,1	77,4	76,9	70,8	67,6	82,4	83,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,5	2,3	3,6	2,4	3,3	2,0
	55-59 ans	2,9	3,6	2,3	4,3	2,5	3,2	2,2
	60-64 ans	2,9	3,5	2,5	3,7	2,7	3,4	2,5
	65-69 ans	3,2	3,9	2,7	4,4	3,3	3,8	2,5
	70-74 ans	3,7	4,0	3,3	5,1	3,2	3,8	3,4
	50-74 ans	3,1	3,7	2,6	4,0	2,7	3,5	2,6
50-74 ans **	3,1	3,7	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,2	99,0	98,2	99,3	98,5	98,1
	55-59 ans	97,3	97,0	97,7	96,0	97,8	97,7	97,6
	60-64 ans	98,3	98,3	98,3	94,8	97,7	99,5	98,5
	65-69 ans	97,7	98,5	96,6	98,5	94,1	98,5	97,3
	70-74 ans	97,2	97,5	96,9	95,5	91,1	98,1	98,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	50-74 ans	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		97,8	97,9	97,7	96,9	97,2	98,6	97,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)								
	50-54 ans	86,7	85,2	88,6	86,1	88,6	82,8	88,5
	55-59 ans	83,4	83,9	82,9	78,8	81,5	87,7	83,7
	60-64 ans	85,5	86,1	84,7	85,0	81,3	86,5	85,9
	65-69 ans	86,8	87,2	86,4	89,3	83,3	86,5	87,3
	70-74 ans	85,0	86,6	83,3	82,1	76,4	88,0	84,6
	50-74 ans	85,5	85,9	85,2	84,4	84,1	86,7	85,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
	50-54 ans	88,9	90,2	87,4	89,7	86,0	91,5	91,3
	55-59 ans	88,3	87,4	89,5	85,5	88,2	88,6	90,2
	60-64 ans	90,1	91,8	88,2	91,2	83,7	91,9	89,6
	65-69 ans	85,6	85,7	85,4	82,9	85,0	86,6	85,5
	70-74 ans	87,4	88,8	85,9	90,8	80,0	88,3	86,9
	50-74 ans	88,1	88,8	87,2	88,3	85,3	89,1	88,2

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)