

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2010-2011 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Effectifs sur la période 2010-2011  | Age              | Total            |                  |                  | Dépistage initial <sup>§</sup> |                  | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                  | Tous sexes       | Hommes           | Femmes           | Hommes                         | Femmes           | Hommes                              | Femmes           |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 1 167 025        | 532 695          | 634 330          | 403 319                        | 463 191          | 129 376                             | 171 139          |
|   | 55-59 ans        | 1 072 732        | 476 585          | 596 147          | 226 723                        | 262 112          | 249 862                             | 334 035          |
|   | 60-64 ans        | 1 164 613        | 521 489          | 643 124          | 215 682                        | 243 342          | 305 807                             | 399 782          |
|   | 65-69 ans        | 792 494          | 358 133          | 434 361          | 124 069                        | 139 252          | 234 064                             | 295 109          |
|   | 70-74 ans        | 720 556          | 318 388          | 402 168          | 99 990                         | 120 249          | 218 398                             | 281 919          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4 917 420</b> | <b>2 207 290</b> | <b>2 710 130</b> | <b>1 069 783</b>               | <b>1 228 146</b> | <b>1 137 507</b>                    | <b>1 481 984</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 67 432           | 31 274           | 36 158           | 25 159                         | 28 562           | 6 115                               | 7 596            |
|   | 55-59 ans        | 61 904           | 27 865           | 34 039           | 15 523                         | 17 776           | 12 342                              | 16 263           |
|   | 60-64 ans        | 65 263           | 29 394           | 35 869           | 14 563                         | 16 375           | 14 831                              | 19 494           |
|   | 65-69 ans        | 50 032           | 22 031           | 28 001           | 9 811                          | 11 457           | 12 220                              | 16 544           |
|   | 70-74 ans        | 51 231           | 21 470           | 29 761           | 8 647                          | 11 063           | 12 823                              | 18 698           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>295 862</b>   | <b>132 034</b>   | <b>163 828</b>   | <b>73 703</b>                  | <b>85 233</b>    | <b>58 331</b>                       | <b>78 595</b>    |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 41 848           | 19 509           | 22 339           | 14 907                         | 16 647           | 4 602                               | 5 692            |
|   | 55-59 ans        | 40 676           | 18 378           | 22 298           | 8 927                          | 10 055           | 9 451                               | 12 243           |
|   | 60-64 ans        | 45 209           | 20 406           | 24 803           | 8 788                          | 9 665            | 11 618                              | 15 138           |
|   | 65-69 ans        | 34 791           | 15 332           | 19 459           | 5 777                          | 6 678            | 9 555                               | 12 781           |
|   | 70-74 ans        | 35 446           | 15 020           | 20 426           | 4 979                          | 6 251            | 10 041                              | 14 175           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>197 970</b>   | <b>88 645</b>    | <b>109 325</b>   | <b>43 378</b>                  | <b>49 296</b>    | <b>45 267</b>                       | <b>60 029</b>    |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 26 131           | 12 024           | 14 107           | 10 457                         | 12 134           | 1 567                               | 1 973            |
|   | 55-59 ans        | 21 730           | 9 741            | 11 989           | 6 708                          | 7 822            | 3 033                               | 4 167            |
|   | 60-64 ans        | 20 579           | 9 223            | 11 356           | 5 866                          | 6 813            | 3 357                               | 4 543            |
|   | 65-69 ans        | 15 702           | 6 900            | 8 802            | 4 100                          | 4 864            | 2 800                               | 3 938            |
|   | 70-74 ans        | 16 255           | 6 640            | 9 615            | 3 725                          | 4 875            | 2 915                               | 4 740            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>100 397</b>   | <b>44 528</b>    | <b>55 869</b>    | <b>30 856</b>                  | <b>36 508</b>    | <b>13 672</b>                       | <b>19 361</b>    |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 1 140 866        | 520 652          | 620 214          | 392 843                        | 451 048          | 127 809                             | 169 166          |
|   | 55-59 ans        | 1 050 990        | 466 836          | 584 154          | 220 007                        | 254 286          | 246 829                             | 329 868          |
|   | 60-64 ans        | 1 144 023        | 512 258          | 631 765          | 209 808                        | 236 526          | 302 450                             | 395 239          |
|   | 65-69 ans        | 776 787          | 351 229          | 425 558          | 119 965                        | 134 387          | 231 264                             | 291 171          |
|   | 70-74 ans        | 704 288          | 311 738          | 392 550          | 96 255                         | 115 371          | 215 483                             | 277 179          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4 816 954</b> | <b>2 162 713</b> | <b>2 654 241</b> | <b>1 038 878</b>               | <b>1 191 618</b> | <b>1 123 835</b>                    | <b>1 462 623</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif  | 50-54 ans        | 24 923           | 13 319           | 11 604           | 10 289                         | 8 573            | 3 030                               | 3 031            |
|   | 55-59 ans        | 25 591           | 13 721           | 11 870           | 7 166                          | 5 508            | 6 555                               | 6 362            |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2010-2011 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Effectifs sur la période 2010-2011  | Age              | Total          |               |               | Dépistage initial <sup>§</sup> |               | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |               |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|   |                  | Tous sexes     | Hommes        | Femmes        | Hommes                         | Femmes        | Hommes                              | Femmes        |
|   | 60-64 ans        | 30 148         | 15 991        | 14 157        | 7 325                          | 5 793         | 8 666                               | 8 364         |
|   | 65-69 ans        | 22 228         | 11 670        | 10 558        | 4 564                          | 3 763         | 7 106                               | 6 795         |
|   | 70-74 ans        | 22 025         | 11 270        | 10 755        | 4 029                          | 3 567         | 7 241                               | 7 188         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>124 915</b> | <b>65 971</b> | <b>58 944</b> | <b>33 373</b>                  | <b>27 204</b> | <b>32 598</b>                       | <b>31 740</b> |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie   | 50-54 ans        | 24 697         | 13 216        | 11 481        | 10 203                         | 8 475         | 3 013                               | 3 006         |
|   | 55-59 ans        | 25 306         | 13 570        | 11 736        | 7 081                          | 5 452         | 6 489                               | 6 284         |
|   | 60-64 ans        | 29 740         | 15 783        | 13 957        | 7 217                          | 5 711         | 8 566                               | 8 246         |
|   | 65-69 ans        | 21 864         | 11 461        | 10 403        | 4 468                          | 3 703         | 6 993                               | 6 700         |
|   | 70-74 ans        | 21 599         | 11 031        | 10 568        | 3 925                          | 3 492         | 7 106                               | 7 076         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>123 206</b> | <b>65 061</b> | <b>58 145</b> | <b>32 894</b>                  | <b>26 833</b> | <b>32 167</b>                       | <b>31 312</b> |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie   | 50-54 ans        | 21 181         | 11 332        | 9 849         | 8 664                          | 7 148         | 2 668                               | 2 701         |
|   | 55-59 ans        | 21 943         | 11 734        | 10 209        | 5 947                          | 4 574         | 5 787                               | 5 635         |
|   | 60-64 ans        | 26 223         | 13 845        | 12 378        | 6 138                          | 4 930         | 7 707                               | 7 448         |
|   | 65-69 ans        | 19 305         | 10 056        | 9 249         | 3 734                          | 3 174         | 6 322                               | 6 075         |
|   | 70-74 ans        | 18 759         | 9 613         | 9 146         | 3 292                          | 2 876         | 6 321                               | 6 270         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>107 411</b> | <b>56 580</b> | <b>50 831</b> | <b>27 775</b>                  | <b>22 702</b> | <b>28 805</b>                       | <b>28 129</b> |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 19 962         | 10 704        | 9 258         | 8 129                          | 6 680         | 2 575                               | 2 578         |
|   | 55-59 ans        | 20 615         | 11 033        | 9 582         | 5 491                          | 4 188         | 5 542                               | 5 394         |
|   | 60-64 ans        | 24 465         | 12 918        | 11 547        | 5 610                          | 4 505         | 7 308                               | 7 042         |
|   | 65-69 ans        | 17 906         | 9 323         | 8 583         | 3 352                          | 2 875         | 5 971                               | 5 708         |
|   | 70-74 ans        | 17 175         | 8 804         | 8 371         | 2 915                          | 2 540         | 5 889                               | 5 831         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>100 123</b> | <b>52 782</b> | <b>47 341</b> | <b>25 497</b>                  | <b>20 788</b> | <b>27 285</b>                       | <b>26 553</b> |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)                  | 50-54 ans        | 62             | 39            | 23            | 31                             | 16            | 8                                   | 7             |
|   | 55-59 ans        | 65             | 46            | 19            | 30                             | 13            | 16                                  | 6             |
|   | 60-64 ans        | 95             | 68            | 27            | 32                             | 13            | 36                                  | 14            |
|   | 65-69 ans        | 69             | 43            | 26            | 21                             | 9             | 22                                  | 17            |
|   | 70-74 ans        | 80             | 50            | 30            | 21                             | 13            | 29                                  | 17            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>371</b>     | <b>246</b>    | <b>125</b>    | <b>135</b>                     | <b>64</b>     | <b>111</b>                          | <b>61</b>     |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 9              | 4             | 5             | 4                              | 1             | 0                                   | 4             |
|   | 55-59 ans        | 14             | 9             | 5             | 7                              | 2             | 2                                   | 3             |
|   | 60-64 ans        | 28             | 22            | 6             | 12                             | 4             | 10                                  | 2             |
|   | 65-69 ans        | 17             | 9             | 8             | 5                              | 3             | 4                                   | 5             |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2010-2011 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Effectifs sur la période 2010-2011   | Age              | Total          |               |               | Dépistage initial <sup>§</sup> |               | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |               |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|  |                  | Tous sexes     | Hommes        | Femmes        | Hommes                         | Femmes        | Hommes                              | Femmes        |
|  | 70-74 ans        | 25             | 11            | 14            | 4                              | 7             | 7                                   | 7             |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>93</b>      | <b>55</b>     | <b>38</b>     | <b>32</b>                      | <b>17</b>     | <b>23</b>                           | <b>21</b>     |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)                       | 50-54 ans        | 21 048         | 11 274        | 9 774         | 8 625                          | 7 092         | 2 649                               | 2 682         |
|  | 55-59 ans        | 21 764         | 11 648        | 10 116        | 5 894                          | 4 529         | 5 754                               | 5 587         |
|  | 60-64 ans        | 25 952         | 13 734        | 12 218        | 6 097                          | 4 864         | 7 637                               | 7 354         |
|  | 65-69 ans        | 19 086         | 9 956         | 9 130         | 3 694                          | 3 139         | 6 262                               | 5 991         |
|  | 70-74 ans        | 18 494         | 9 495         | 8 999         | 3 248                          | 2 825         | 6 247                               | 6 174         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>106 344</b> | <b>56 107</b> | <b>50 237</b> | <b>27 558</b>                  | <b>22 449</b> | <b>28 549</b>                       | <b>27 788</b> |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                   | 50-54 ans        | 133            | 58            | 75            | 39                             | 56            | 19                                  | 19            |
|  | 55-59 ans        | 179            | 86            | 93            | 53                             | 45            | 33                                  | 48            |
|  | 60-64 ans        | 271            | 111           | 160           | 41                             | 66            | 70                                  | 94            |
|  | 65-69 ans        | 219            | 100           | 119           | 40                             | 35            | 60                                  | 84            |
|  | 70-74 ans        | 265            | 118           | 147           | 44                             | 51            | 74                                  | 96            |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1 067</b>   | <b>473</b>    | <b>594</b>    | <b>217</b>                     | <b>253</b>    | <b>256</b>                          | <b>341</b>    |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans        | 55             | 29            | 26            | 22                             | 18            | 7                                   | 8             |
|  | 55-59 ans        | 70             | 35            | 35            | 15                             | 13            | 20                                  | 22            |
|  | 60-64 ans        | 120            | 61            | 59            | 27                             | 16            | 34                                  | 43            |
|  | 65-69 ans        | 138            | 64            | 74            | 23                             | 29            | 41                                  | 45            |
|  | 70-74 ans        | 184            | 92            | 92            | 32                             | 29            | 60                                  | 63            |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>567</b>     | <b>281</b>    | <b>286</b>    | <b>119</b>                     | <b>105</b>    | <b>162</b>                          | <b>181</b>    |

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2010-2011 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2010-2011   | Age              | Total       |             |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|  |                  | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)         | 50-54 ans        | 5,8         | 5,9         | 5,7         | 6,2                            | 6,2         | 4,7                                 | 4,4         |
|  | 55-59 ans        | 5,8         | 5,8         | 5,7         | 6,8                            | 6,8         | 4,9                                 | 4,9         |
|  | 60-64 ans        | 5,6         | 5,6         | 5,6         | 6,8                            | 6,7         | 4,8                                 | 4,9         |
|  | 65-69 ans        | 6,3         | 6,2         | 6,4         | 7,9                            | 8,2         | 5,2                                 | 5,6         |
|  | 70-74 ans        | 7,1         | 6,7         | 7,4         | 8,6                            | 9,2         | 5,9                                 | 6,6         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>6,0</b>  | <b>6,0</b>  | <b>6,0</b>  | <b>6,9</b>                     | <b>6,9</b>  | <b>5,1</b>                          | <b>5,3</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans        | 2,2         | 2,3         | 2,2         | 2,6                            | 2,6         | 1,2                                 | 1,2         |
|  | 55-59 ans        | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 3,0                            | 3,0         | 1,2                                 | 1,2         |
|  | 60-64 ans        | 1,8         | 1,8         | 1,8         | 2,7                            | 2,8         | 1,1                                 | 1,1         |
|  | 65-69 ans        | 2,0         | 1,9         | 2,0         | 3,3                            | 3,5         | 1,2                                 | 1,3         |
|  | 70-74 ans        | 2,3         | 2,1         | 2,4         | 3,7                            | 4,1         | 1,3                                 | 1,7         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>  | <b>2,1</b>  | <b>2,9</b>                     | <b>3,0</b>  | <b>1,2</b>                          | <b>1,3</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                    | 50-54 ans        | 62,1        | 62,4        | 61,8        | 59,3                           | 58,3        | 75,3                                | 74,9        |
|  | 55-59 ans        | 65,7        | 66,0        | 65,5        | 57,5                           | 56,6        | 76,6                                | 75,3        |
|  | 60-64 ans        | 69,3        | 69,4        | 69,1        | 60,3                           | 59,0        | 78,3                                | 77,7        |
|  | 65-69 ans        | 69,5        | 69,6        | 69,5        | 58,9                           | 58,3        | 78,2                                | 77,3        |
|  | 70-74 ans        | 69,2        | 70,0        | 68,6        | 57,6                           | 56,5        | 78,3                                | 75,8        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>66,9</b> | <b>67,1</b> | <b>66,7</b> | <b>58,9</b>                    | <b>57,8</b> | <b>77,6</b>                         | <b>76,4</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                   | 50-54 ans        | 2,2         | 2,6         | 1,9         | 2,6                            | 1,9         | 2,4                                 | 1,8         |
|  | 55-59 ans        | 2,4         | 2,9         | 2,0         | 3,3                            | 2,2         | 2,7                                 | 1,9         |
|  | 60-64 ans        | 2,6         | 3,1         | 2,2         | 3,5                            | 2,4         | 2,9                                 | 2,1         |
|  | 65-69 ans        | 2,9         | 3,3         | 2,5         | 3,8                            | 2,8         | 3,1                                 | 2,3         |
|  | 70-74 ans        | 3,1         | 3,6         | 2,7         | 4,2                            | 3,1         | 3,4                                 | 2,6         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>2,6</b>  | <b>3,1</b>  | <b>2,2</b>  | <b>3,2</b>                     | <b>2,3</b>  | <b>2,9</b>                          | <b>2,2</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>  | <b>2,6</b>       | <b>3,0</b>  | <b>2,2</b>  | .           | .                              | .           | .                                   |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                            | 50-54 ans        | 99,1        | 99,2        | 98,9        | 99,2                           | 98,9        | 99,4                                | 99,2        |
|  | 55-59 ans        | 98,9        | 98,9        | 98,9        | 98,8                           | 99,0        | 99,0                                | 98,8        |
|  | 60-64 ans        | 98,6        | 98,7        | 98,6        | 98,5                           | 98,6        | 98,8                                | 98,6        |
|  | 65-69 ans        | 98,4        | 98,2        | 98,5        | 97,9                           | 98,4        | 98,4                                | 98,6        |
|  | 70-74 ans        | 98,1        | 97,9        | 98,3        | 97,4                           | 97,9        | 98,1                                | 98,4        |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Date de réalisation du présent document = 24/10/2013

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2010-2011 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2010-2011  | Age              | Total       |             |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                  | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>98,6</b> | <b>98,6</b> | <b>98,6</b> | <b>98,6</b>                    | <b>98,6</b> | <b>98,7</b>                         | <b>98,7</b> |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 85,8        | 85,7        | 85,8        | 84,9                           | 84,3        | 88,5                                | 89,9        |
|   | 55-59 ans        | 86,7        | 86,5        | 87,0        | 84,0                           | 83,9        | 89,2                                | 89,7        |
|   | 60-64 ans        | 88,2        | 87,7        | 88,7        | 85,0                           | 86,3        | 90,0                                | 90,3        |
|   | 65-69 ans        | 88,3        | 87,7        | 88,9        | 83,6                           | 85,7        | 90,4                                | 90,7        |
|   | 70-74 ans        | 86,9        | 87,1        | 86,5        | 83,9                           | 82,4        | 89,0                                | 88,6        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>87,2</b> | <b>87,0</b> | <b>87,4</b> | <b>84,4</b>                    | <b>84,6</b> | <b>89,5</b>                         | <b>89,8</b> |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 94,2        | 94,5        | 94,0        | 93,8                           | 93,5        | 96,5                                | 95,4        |
|   | 55-59 ans        | 93,9        | 94,0        | 93,9        | 92,3                           | 91,6        | 95,8                                | 95,7        |
|   | 60-64 ans        | 93,3        | 93,3        | 93,3        | 91,4                           | 91,4        | 94,8                                | 94,5        |
|   | 65-69 ans        | 92,8        | 92,7        | 92,8        | 89,8                           | 90,6        | 94,4                                | 94,0        |
|   | 70-74 ans        | 91,6        | 91,6        | 91,5        | 88,5                           | 88,3        | 93,2                                | 93,0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>93,2</b> | <b>93,3</b> | <b>93,1</b> | <b>91,8</b>                    | <b>91,6</b> | <b>94,7</b>                         | <b>94,4</b> |

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)