

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

| | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 4359 | 2049 | 2310 | 1800 | 1917 | 249 | 393 |
| | 55-59 ans | 3674 | 1713 | 1961 | 1334 | 1328 | 379 | 633 |
| | 60-64 ans | 4599 | 2173 | 2426 | 1531 | 1555 | 642 | 871 |
| | 65-69 ans | 2229 | 1028 | 1201 | 655 | 710 | 373 | 491 |
| | 70-74 ans | 2995 | 1371 | 1624 | 894 | 954 | 477 | 670 |
| | 50-74 ans | 17856 | 8334 | 9522 | 6214 | 6464 | 2120 | 3058 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 124 | 57 | 67 | 48 | 62 | 9 | 5 |
| | 55-59 ans | 105 | 50 | 55 | 37 | 43 | 13 | 12 |
| | 60-64 ans | 114 | 48 | 66 | 38 | 49 | 10 | 17 |
| | 65-69 ans | 57 | 26 | 31 | 21 | 21 | 5 | 10 |
| | 70-74 ans | 113 | 44 | 69 | 31 | 52 | 13 | 17 |
| | 50-74 ans | 513 | 225 | 288 | 175 | 227 | 50 | 61 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 72 | 31 | 41 | 28 | 38 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 69 | 36 | 33 | 24 | 26 | 12 | 7 |
| | 60-64 ans | 74 | 30 | 44 | 23 | 35 | 7 | 9 |
| | 65-69 ans | 38 | 21 | 17 | 17 | 13 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 75 | 31 | 44 | 20 | 32 | 11 | 12 |
| | 50-74 ans | 328 | 149 | 179 | 112 | 144 | 37 | 35 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 52 | 26 | 26 | 20 | 24 | 6 | 2 |
| | 55-59 ans | 36 | 14 | 22 | 13 | 17 | 1 | 5 |
| | 60-64 ans | 40 | 18 | 22 | 15 | 14 | 3 | 8 |
| | 65-69 ans | 19 | 5 | 14 | 4 | 8 | 1 | 6 |
| | 70-74 ans | 38 | 13 | 25 | 11 | 20 | 2 | 5 |
| | 50-74 ans | 185 | 76 | 109 | 63 | 83 | 13 | 26 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 4307 | 2023 | 2284 | 1780 | 1893 | 243 | 391 |
| | 55-59 ans | 3638 | 1699 | 1939 | 1321 | 1311 | 378 | 628 |
| | 60-64 ans | 4559 | 2155 | 2404 | 1516 | 1541 | 639 | 863 |
| | 65-69 ans | 2210 | 1023 | 1187 | 651 | 702 | 372 | 485 |
| | 70-74 ans | 2957 | 1358 | 1599 | 883 | 934 | 475 | 665 |
| | 50-74 ans | 17671 | 8258 | 9413 | 6151 | 6381 | 2107 | 3032 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 84 | 51 | 33 | 43 | 28 | 8 | 5 |
| | 55-59 ans | 82 | 45 | 37 | 34 | 23 | 11 | 14 |
| | 60-64 ans | 111 | 59 | 52 | 40 | 37 | 19 | 15 |
| | 65-69 ans | 68 | 34 | 34 | 22 | 19 | 12 | 15 |
| | 70-74 ans | 98 | 54 | 44 | 38 | 23 | 16 | 21 |
| | 50-74 ans | 443 | 243 | 200 | 177 | 130 | 66 | 70 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 83 | 50 | 33 | 42 | 28 | 8 | 5 |
| | 55-59 ans | 79 | 42 | 37 | 31 | 23 | 11 | 14 |
| | 60-64 ans | 110 | 58 | 52 | 39 | 37 | 19 | 15 |
| | 65-69 ans | 68 | 34 | 34 | 22 | 19 | 12 | 15 |
| | 70-74 ans | 97 | 53 | 44 | 37 | 23 | 16 | 21 |
| | 50-74 ans | 437 | 237 | 200 | 171 | 130 | 66 | 70 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 79 | 49 | 30 | 41 | 26 | 8 | 4 |
| | 55-59 ans | 73 | 40 | 33 | 29 | 22 | 11 | 11 |
| | 60-64 ans | 104 | 54 | 50 | 35 | 35 | 19 | 15 |
| | 65-69 ans | 62 | 31 | 31 | 20 | 17 | 11 | 14 |
| | 70-74 ans | 92 | 49 | 43 | 35 | 22 | 14 | 21 |
| | 50-74 ans | 410 | 223 | 187 | 160 | 122 | 63 | 65 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 76 | 47 | 29 | 39 | 25 | 8 | 4 |
| | 55-59 ans | 71 | 39 | 32 | 29 | 21 | 10 | 11 |
| | 60-64 ans | 97 | 50 | 47 | 33 | 33 | 17 | 14 |
| | 65-69 ans | 56 | 30 | 26 | 19 | 16 | 11 | 10 |
| | 70-74 ans | 83 | 45 | 38 | 31 | 20 | 14 | 18 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | 50-74 ans | 383 | 211 | 172 | 151 | 115 | 60 | 57 |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 79 | 49 | 30 | 41 | 26 | 8 | 4 |
| | 55-59 ans | 73 | 40 | 33 | 29 | 22 | 11 | 11 |
| | 60-64 ans | 104 | 54 | 50 | 35 | 35 | 19 | 15 |
| | 65-69 ans | 61 | 31 | 30 | 20 | 17 | 11 | 13 |
| | 70-74 ans | 91 | 49 | 42 | 35 | 22 | 14 | 20 |
| | 50-74 ans | 408 | 223 | 185 | 160 | 122 | 63 | 63 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 79 | 49 | 30 | 41 | 26 | 8 | 4 |
| | 55-59 ans | 73 | 40 | 33 | 29 | 22 | 11 | 11 |
| | 60-64 ans | 103 | 54 | 49 | 35 | 35 | 19 | 14 |
| | 65-69 ans | 61 | 31 | 30 | 20 | 17 | 11 | 13 |
| | 70-74 ans | 92 | 49 | 43 | 35 | 22 | 14 | 21 |
| | 50-74 ans | 408 | 223 | 185 | 160 | 122 | 63 | 63 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 79 | 49 | 30 | 41 | 26 | 8 | 4 |
| | 55-59 ans | 73 | 40 | 33 | 29 | 22 | 11 | 11 |
| | 60-64 ans | 104 | 54 | 50 | 35 | 35 | 19 | 15 |
| | 65-69 ans | 62 | 31 | 31 | 20 | 17 | 11 | 14 |
| | 70-74 ans | 93 | 50 | 43 | 36 | 22 | 14 | 21 |
| | 50-74 ans | 411 | 224 | 187 | 161 | 122 | 63 | 65 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 43 | 25 | 18 | 22 | 15 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 39 | 22 | 17 | 14 | 9 | 8 | 8 |
| | 60-64 ans | 50 | 20 | 30 | 11 | 20 | 9 | 10 |
| | 65-69 ans | 35 | 15 | 20 | 9 | 10 | 6 | 10 |
| | 70-74 ans | 36 | 14 | 22 | 11 | 13 | 3 | 9 |
| | 50-74 ans | 203 | 96 | 107 | 67 | 67 | 29 | 40 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 22 | 12 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 14 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 41 | 22 | 19 | 17 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 16 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 16 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 19 | 14 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 25 | 15 | 10 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | 50-74 ans | 85 | 55 | 30 | 42 | 23 | 13 | 7 | 7 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 11 | 9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 31 | 23 | 8 | 18 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 22 | 15 | 7 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 22 | 10 | 12 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 33 | 24 | 9 | 18 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 33 | 19 | 14 | 15 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| | 50-74 ans | 126 | 77 | 49 | 59 | 35 | 18 | 14 | 14 |
| A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté | 50-54 ans | 16 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 55-59 ans | 16 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 19 | 14 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| | 65-69 ans | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 25 | 15 | 10 | 11 | 5 | 4 | 5 |
| | 50-74 ans | 85 | 55 | 30 | 42 | 23 | 13 | 7 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 11 | 9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 31 | 23 | 8 | 18 | 5 | 5 | 3 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 27 | 19 | 8 | 15 | 5 | 4 | 3 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 20 | 13 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 13 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 25 | 17 | 8 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| Indicateurs sur la période 2009-2010 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 1,3 | |
| | 55-59 ans | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 1,9 | |
| | 60-64 ans | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 1,6 | 2 | |
| | 65-69 ans | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 3 | 1,3 | 2 | |
| | 70-74 ans | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 3,5 | 5,5 | 2,7 | 2,5 | |
| | 50-74 ans | 2,9 | 2,7 | 3 | 2,8 | 3,5 | 2,4 | 2 | |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,4 | 0,5 | |
| | 55-59 ans | 1 | 0,8 | 1,1 | 1 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | |
| | 60-64 ans | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | |
| | 65-69 ans | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | |
| | 70-74 ans | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 0,4 | 0,7 | |
| | 50-74 ans | 1 | 0,9 | 1,1 | 1 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 58,1 | 54,4 | 61,2 | 58,3 | 61,3 | 33,3 | 60 | |
| | 55-59 ans | 65,7 | 72 | 60 | 64,9 | 60,5 | 92,3 | 58,3 | |
| | 60-64 ans | 64,9 | 62,5 | 66,7 | 60,5 | 71,4 | 70 | 52,9 | |
| | 65-69 ans | 66,7 | 80,8 | 54,8 | 81 | 61,9 | 80 | 40 | |
| | 70-74 ans | 66,4 | 70,5 | 63,8 | 64,5 | 61,5 | 84,6 | 70,6 | |
| | 50-74 ans | 63,9 | 66,2 | 62,2 | 64 | 63,4 | 74 | 57,4 | |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2 | 2,5 | 1,4 | 2,4 | 1,5 | 3,3 | 1,3 | |
| | 55-59 ans | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 1,8 | 2,9 | 2,2 | |
| | 60-64 ans | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 3 | 1,7 | |
| | 65-69 ans | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | |
| | 70-74 ans | 3,3 | 4 | 2,8 | 4,3 | 2,5 | 3,4 | 3,2 | |
| | 50-74 ans | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 2 | 3,1 | 2,3 | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 98,8 | 98 | 100 | 97,7 | 100 | 100 | 100 | |
| | 55-59 ans | 96,3 | 93,3 | 100 | 91,2 | 100 | 100 | 100 | |
| | 60-64 ans | 99,1 | 98,3 | 100 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 70-74 ans | 99 | 98,1 | 100 | 97,4 | 100 | 100 | 100 | |
| | 50-74 ans | 98,6 | 97,5 | 100 | 96,6 | 100 | 100 | 100 | |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 95,2 | 98 | 90,9 | 97,6 | 92,9 | 100 | 80 | |
| | 55-59 ans | 92,4 | 95,2 | 89,2 | 93,5 | 95,7 | 100 | 78,6 | |
| | 60-64 ans | 94,5 | 93,1 | 96,2 | 89,7 | 94,6 | 100 | 100 | |
| | 65-69 ans | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 90,9 | 89,5 | 91,7 | 93,3 | |
| | 70-74 ans | 94,8 | 92,5 | 97,7 | 94,6 | 95,7 | 87,5 | 100 | |
| | 50-74 ans | 93,8 | 94,1 | 93,5 | 93,6 | 93,8 | 95,5 | 92,9 | |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 96,2 | 95,9 | 96,7 | 95,1 | 96,2 | 100 | 100 | |
| | 55-59 ans | 97,3 | 97,5 | 97 | 100 | 95,5 | 90,9 | 100 | |
| | 60-64 ans | 93,3 | 92,6 | 94 | 94,3 | 94,3 | 89,5 | 93,3 | |
| | 65-69 ans | 90,3 | 96,8 | 83,9 | 95 | 94,1 | 100 | 71,4 | |
| | 70-74 ans | 90,2 | 91,8 | 88,4 | 88,6 | 90,9 | 100 | 85,7 | |
| | 50-74 ans | 93,4 | 94,6 | 92 | 94,4 | 94,3 | 95,2 | 87,7 | |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 83 | 80 | 89 | 82 | 89 | 73 | 88 | |
| | 55-59 ans | 84 | 84 | 85 | 82 | 85 | 90 | 84 | |
| | 60-64 ans | 94 | 92 | 96 | 100 | 106 | 78 | 72 | |
| | 65-69 ans | 113 | 102 | 124 | 117 | 140 | 76 | 105 | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 70-74 ans | 95 | 98 | 92 | 104 | 103 | 86 | 80 |
| | 50-74 ans | 93 | 91 | 96 | 95 | 103 | 81 | 85 |
| C03- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 2,2 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1,9 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0,8 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 93,3 |
| | 65-69 ans | 98,4 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 92,9 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,5 | 100 | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 96,9 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 54,4 | 51 | 60 | 53,7 | 57,7 | 37,5 | 75 |
| | 55-59 ans | 53,4 | 55 | 51,5 | 48,3 | 40,9 | 72,7 | 72,7 |
| | 60-64 ans | 48,1 | 37 | 60 | 31,4 | 57,1 | 47,4 | 66,7 |
| | 65-69 ans | 56,5 | 48,4 | 64,5 | 45 | 58,8 | 54,5 | 71,4 |
| | 70-74 ans | 38,7 | 28 | 51,2 | 30,6 | 59,1 | 21,4 | 42,9 |
| | 50-74 ans | 49,4 | 42,9 | 57,2 | 41,6 | 54,9 | 46 | 61,5 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 2,5 | 2 | 3,3 | 2,4 | 0 | 0 | 25 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3,8 | 1,9 | 6 | 2,9 | 8,6 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,6 | 0 | 3,2 | 0 | 5,9 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 4,3 | 4 | 4,7 | 5,6 | 4,5 | 0 | 4,8 |
| | 50-74 ans | 2,7 | 1,8 | 3,7 | 2,5 | 4,1 | 0 | 3,1 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 8,9 | 10,2 | 6,7 | 7,3 | 7,7 | 25 | 0 |
| | 55-59 ans | 5,5 | 5 | 6,1 | 6,9 | 9,1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4,8 | 1,9 | 8 | 0 | 8,6 | 5,3 | 6,7 |
| | 65-69 ans | 3,2 | 6,5 | 0 | 5 | 0 | 9,1 | 0 |
| | 70-74 ans | 4,3 | 4 | 4,7 | 2,8 | 4,5 | 7,1 | 4,8 |
| | 50-74 ans | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 4,3 | 6,6 | 7,9 | 3,1 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 7,6 | 8,2 | 6,7 | 7,3 | 7,7 | 12,5 | 0 |
| | 55-59 ans | 8,2 | 0 | 18,2 | 0 | 22,7 | 0 | 9,1 |
| | 60-64 ans | 13,5 | 18,5 | 8 | 20 | 5,7 | 15,8 | 13,3 |
| | 65-69 ans | 11,3 | 12,9 | 9,7 | 15 | 5,9 | 9,1 | 14,3 |
| | 70-74 ans | 8,6 | 8 | 9,3 | 11,1 | 9,1 | 0 | 9,5 |
| | 50-74 ans | 10 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 9,8 | 7,9 | 10,8 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 20,3 | 22,4 | 16,7 | 22 | 19,2 | 25 | 0 |
| | 55-59 ans | 21,9 | 25 | 18,2 | 27,6 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| | 60-64 ans | 18,3 | 25,9 | 10 | 31,4 | 14,3 | 15,8 | 0 |
| | 65-69 ans | 14,5 | 16,1 | 12,9 | 15 | 23,5 | 18,2 | 0 |
| | 70-74 ans | 26,9 | 30 | 23,3 | 30,6 | 22,7 | 28,6 | 23,8 |
| | 50-74 ans | 20,7 | 24,6 | 16 | 26,1 | 18,9 | 20,6 | 10,8 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,8 | 4,1 | 3,3 | 4,9 | 3,8 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 8,2 | 10 | 6,1 | 13,8 | 9,1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 6,7 | 9,3 | 4 | 11,4 | 2,9 | 5,3 | 6,7 |
| | 65-69 ans | 6,5 | 9,7 | 3,2 | 10 | 5,9 | 9,1 | 0 |
| | 70-74 ans | 11,8 | 18 | 4,7 | 16,7 | 0 | 21,4 | 9,5 |
| | 50-74 ans | 7,5 | 10,3 | 4,3 | 11,2 | 4,1 | 7,9 | 4,6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,7 | 5 | 0 | 3,4 | 0 | 9,1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 1,9 | 2 | 0 | 2,9 | 5,3 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,2 | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 7,1 | 4,8 |
| | 50-74 ans | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 4,8 | 1,5 |
| | | | | | | | | |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2,5 | 2 | 3,3 | 2,4 | 3,8 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 0 |
| | 65-69 ans | 4,8 | 6,5 | 3,2 | 10 | 0 | 0 | 7,1 |
| | 70-74 ans | 2,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,9 | 2,7 | 1,1 | 1,9 | 0,8 | 4,8 | 1,5 |
| | | | | | | | | |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,9 | 0 | 0 | 6,7 |
| | 65-69 ans | 1,6 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| | 70-74 ans | 1,1 | 2 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0 | 0 | 3,1 |
| | | | | | | | | |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 5,1 | 7,4 | 3,1 | 6,7 | 3,7 | 12,3 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 5,9 | 6,2 | 6,1 | 6,9 | 5,3 | 4,8 |
| | 60-64 ans | 7,2 | 11,1 | 3,7 | 11,9 | 4,5 | 9,4 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 7,2 | 8,8 | 5,9 | 9,2 | 7,1 | 8,1 | 4,1 |
| | 70-74 ans | 11,2 | 14 | 8,8 | 17 | 7,5 | 8,4 | 10,5 |
| | 50-74 ans | 7,1 | 9,3 | 5,2 | 9,6 | 5,5 | 8,5 | 4,6 |
| | 50-74 ans ** | 7 | 8,9 | 5,3 | . | . | . | . |
| D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,7 | 5,4 | 2,2 | 5,1 | 2,6 | 8,2 | 0 |
| | 55-59 ans | 4,4 | 5,9 | 3,1 | 6,1 | 3,1 | 5,3 | 3,2 |
| | 60-64 ans | 4,2 | 6,5 | 2,1 | 7,3 | 3,2 | 4,7 | 0 |
| | 65-69 ans | 4,1 | 4,9 | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 5,4 | 0 |
| | 70-74 ans | 8,5 | 11 | 6,3 | 12,5 | 5,4 | 8,4 | 7,5 |
| | 50-74 ans | 4,8 | 6,7 | 3,2 | 6,8 | 3,6 | 6,2 | 2,3 |
| | 50-74 ans ** | 4,7 | 6,4 | 3,2 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,7 | 1 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 2,4 | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 2,3 | 0,8 | 2,6 | 0,6 | 1,6 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 2,9 | 0,8 | 3,1 | 1,4 | 2,7 | 0 |
| | 70-74 ans | 3,7 | 6,6 | 1,3 | 6,8 | 0 | 6,3 | 3 |
| | 50-74 ans | 1,8 | 2,8 | 0,8 | 2,9 | 0,8 | 2,4 | 1 |
| | 50-74 ans ** | 1,7 | 2,7 | 0,8 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 28,6 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 33,3 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 40 | 37,5 | 50 | 40 | 0 | 33,3 | 50 |
| | 50-74 ans | 25,9 | 31,6 | 12,5 | 33,3 | 0 | 25 | 33,3 |
| | | | | | | | | |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des