

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	18103	8312	9791	4802	5341	3510	4450
	55-59 ans	19520	9072	10448	1210	1180	7862	9268
	60-64 ans	17793	8551	9242	888	889	7663	8353
	65-69 ans	13545	6316	7229	437	528	5879	6701
	70-74 ans	12680	5704	6976	341	427	5363	6549
	50-74 ans	81641	37955	43686	7678	8365	30277	35321
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1246	564	682	315	394	249	288
	55-59 ans	1485	672	813	127	111	545	702
	60-64 ans	1287	671	616	86	84	585	532
	65-69 ans	1042	503	539	52	64	451	475
	70-74 ans	1043	467	576	51	61	416	515
	50-74 ans	6103	2877	3226	631	714	2246	2512
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	855	394	461	199	245	195	216
	55-59 ans	1056	476	580	79	59	397	521
	60-64 ans	931	464	467	42	51	422	416
	65-69 ans	747	342	405	26	36	316	369
	70-74 ans	724	311	413	25	32	286	381
	50-74 ans	4313	1987	2326	371	423	1616	1903
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	391	170	221	116	149	54	72
	55-59 ans	429	196	233	48	52	148	181
	60-64 ans	356	207	149	44	33	163	116
	65-69 ans	295	161	134	26	28	135	106
	70-74 ans	319	156	163	26	29	130	134
	50-74 ans	1790	890	900	260	291	630	609
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17712	8142	9570	4686	5192	3456	4378
	55-59 ans	19091	8876	10215	1162	1128	7714	9087
	60-64 ans	17437	8344	9093	844	856	7500	8237
	65-69 ans	13250	6155	7095	411	500	5744	6595
	70-74 ans	12361	5548	6813	315	398	5233	6415
	50-74 ans	79851	37065	42786	7418	8074	29647	34712
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	425	229	196	137	103	92	93
	55-59 ans	490	252	238	36	28	216	210
	60-64 ans	528	315	213	35	29	280	184
	65-69 ans	426	235	191	20	22	215	169
	70-74 ans	449	242	207	20	24	222	183
	50-74 ans	2318	1273	1045	248	206	1025	839
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	416	223	193	134	102	89	91
	55-59 ans	480	248	232	36	28	212	204
	60-64 ans	515	308	207	34	29	274	178
	65-69 ans	411	225	186	20	22	205	164
	70-74 ans	426	227	199	19	24	208	175
	50-74 ans	2248	1231	1017	243	205	988	812
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	383	209	174	124	91	85	83
	55-59 ans	450	236	214	35	27	201	187
	60-64 ans	480	285	195	31	28	254	167
	65-69 ans	387	213	174	18	21	195	153
	70-74 ans	388	210	178	15	23	195	155
	50-74 ans	2088	1153	935	223	190	930	745
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	378	206	172	122	89	84	83
	55-59 ans	438	230	208	34	24	196	184
	60-64 ans	468	278	190	30	24	248	166
	65-69 ans	371	205	166	17	21	188	145
	70-74 ans	374	203	171	13	20	190	151

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	2029	1122	907	216	178	906	729
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	8	7	1	0	0	7	1
	65-69 ans	7	6	1	0	0	6	1
	70-74 ans	11	9	2	2	0	7	2
	50-74 ans	36	28	8	4	2	24	6
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	380	208	172	123	89	85	83
	55-59 ans	447	234	213	35	27	199	186
	60-64 ans	475	284	191	31	24	253	167
	65-69 ans	382	212	170	18	21	194	149
	70-74 ans	381	206	175	14	22	192	153
	50-74 ans	2065	1144	921	221	183	923	738
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	1	4	0	4	1	0
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	50-74 ans	23	9	14	2	7	7	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	383	209	174	124	91	85	83
	55-59 ans	450	236	214	35	27	201	187
	60-64 ans	480	285	195	31	28	254	167
	65-69 ans	387	213	174	18	21	195	153
	70-74 ans	388	210	178	15	23	195	155
	50-74 ans	2088	1153	935	223	190	930	745
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	383	209	174	124	91	85	83
	55-59 ans	450	236	214	35	27	201	187
	60-64 ans	481	285	196	31	28	254	168
	65-69 ans	387	213	174	18	21	195	153
	70-74 ans	389	211	178	15	23	196	155
	50-74 ans	2090	1154	936	223	190	931	746
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	225	114	111	76	62	38	49
	55-59 ans	241	106	135	17	18	89	117
	60-64 ans	204	88	116	8	15	80	101
	65-69 ans	159	68	91	9	12	59	79
	70-74 ans	153	63	90	2	11	61	79
	50-74 ans	982	439	543	112	118	327	425
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	25	16	9	10	6	6	3
	55-59 ans	31	18	13	3	1	15	12
	60-64 ans	31	17	14	2	2	15	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	31	15	16	1	3	14	13
	70-74 ans	28	15	13	2	2	13	11
	50-74 ans	146	81	65	18	14	63	51
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	14	9	5	1	2	8	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	42	26	16	11	8	15	8
	55-59 ans	47	26	21	3	2	23	19
	60-64 ans	87	58	29	3	2	55	27
	65-69 ans	66	46	20	1	3	45	17
	70-74 ans	62	40	22	5	4	35	18
	50-74 ans	304	196	108	23	19	173	89
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	61	36	25	19	11	17	14
	55-59 ans	92	65	27	9	2	56	25
	60-64 ans	99	74	25	9	6	65	19
	65-69 ans	74	50	24	2	3	48	21
	70-74 ans	95	66	29	4	2	62	27
	50-74 ans	421	291	130	43	24	248	106
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	16	11	5	4	2	7	3
	55-59 ans	21	13	8	3	2	10	6
	60-64 ans	40	34	6	5	1	29	5
	65-69 ans	37	22	15	3	0	19	15
	70-74 ans	34	19	15	2	2	17	13
	50-74 ans	148	99	49	17	7	82	42
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	2	6	2	2	0	4
	55-59 ans	11	4	7	0	1	4	6
	60-64 ans	15	13	2	4	1	9	1
	65-69 ans	15	8	7	2	0	6	7
	70-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
	50-74 ans	56	29	27	8	5	21	22
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
	50-74 ans	19	10	9	1	1	9	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	103	62	41	30	19	32	22
	55-59 ans	139	91	48	12	4	79	44
	60-64 ans	186	132	54	12	8	120	46
	65-69 ans	140	96	44	3	6	93	38
	70-74 ans	157	106	51	9	6	97	45
	50-74 ans	725	487	238	66	43	421	195
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	61	36	25	19	11	17	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	92	65	27	9	2	56	25
	60-64 ans	99	74	25	9	6	65	19
	65-69 ans	74	50	24	2	3	48	21
	70-74 ans	95	66	29	4	2	62	27
	50-74 ans	421	291	130	43	24	248	106
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	11	5	4	2	7	3
	55-59 ans	21	13	8	3	2	10	6
	60-64 ans	40	34	6	5	1	29	5
	65-69 ans	37	22	15	3	0	19	15
	70-74 ans	34	19	15	2	2	17	13
	50-74 ans	148	99	49	17	7	82	42
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	15	10	5	4	2	6	3
	55-59 ans	19	12	7	2	2	10	5
	60-64 ans	40	34	6	5	1	29	5
	65-69 ans	28	15	13	2	0	13	13
	70-74 ans	30	16	14	2	2	14	12
	50-74 ans	132	87	45	15	7	72	38
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	15	10	5	4	2	6	3
	55-59 ans	19	12	7	2	2	10	5
	60-64 ans	40	34	6	5	1	29	5
	65-69 ans	27	14	13	2	0	12	13
	70-74 ans	29	15	14	2	2	13	12
	50-74 ans	130	85	45	15	7	70	38
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	6	2	2	1	4	1
	55-59 ans	14	10	4	1	2	9	2
	60-64 ans	25	21	4	2	1	19	3
	65-69 ans	19	9	10	1	0	8	10
	70-74 ans	19	11	8	1	2	10	6
	50-74 ans	85	57	28	7	6	50	22
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	4	3	2	1	2	2
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	15	13	2	3	0	10	2
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	10	4	6	1	0	3	6
	50-74 ans	45	28	17	8	1	20	16
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	5	2	1	1	4	1
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	14	12	2	1	0	11	2
	65-69 ans	12	6	6	0	0	6	6
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	42	29	13	3	1	26	12
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	17	10	7	2	2	8	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	7	3	4	0	2	3	2
	50-74 ans	16	11	5	1	2	10	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	10	7	3	1	1	6	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	15	10	5	4	2	6	3
	55-59 ans	18	12	6	2	2	10	4
	60-64 ans	39	33	6	5	1	28	5
	65-69 ans	26	13	13	1	0	12	13
	70-74 ans	28	14	14	2	2	12	12
	50-74 ans	126	82	44	14	7	68	37
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	6	12	6	7	0	5
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4
	60-64 ans	12	8	4	0	1	8	3
	65-69 ans	10	6	4	2	1	4	3
	70-74 ans	14	8	6	2	0	6	6
	50-74 ans	61	30	31	11	10	19	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	6,8	7	6,6	7,4	7,1	6,5
	55-59 ans	7,6	7,4	7,8	10,5	9,4	6,9	7,6
	60-64 ans	7,2	7,8	6,7	9,7	9,4	7,6	6,4
	65-69 ans	7,7	8	7,5	11,9	12,1	7,7	7,1
	70-74 ans	8,2	8,2	8,3	15	14,3	7,8	7,9
	50-74 ans	7,5	7,6	7,4	8,2	8,5	7,4	7,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2	2,3	2,4	2,8	1,5	1,6
	55-59 ans	2,2	2,2	2,2	4	4,4	1,9	2
	60-64 ans	2	2,4	1,6	5	3,7	2,1	1,4
	65-69 ans	2,2	2,5	1,9	5,9	5,3	2,3	1,6
	70-74 ans	2,5	2,7	2,3	7,6	6,8	2,4	2
	50-74 ans	2,2	2,3	2,1	3,4	3,5	2,1	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,6	69,9	67,6	63,2	62,2	78,3	75
	55-59 ans	71,1	70,8	71,3	62,2	53,2	72,8	74,2
	60-64 ans	72,3	69,2	75,8	48,8	60,7	72,1	78,2
	65-69 ans	71,7	68	75,1	50	56,3	70,1	77,7
	70-74 ans	69,4	66,6	71,7	49	52,5	68,8	74
	50-74 ans	70,7	69,1	72,1	58,8	59,2	72	75,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,8	2	2,9	2	2,7	2,1
	55-59 ans	2,6	2,8	2,3	3,1	2,5	2,8	2,3
	60-64 ans	3	3,8	2,3	4,1	3,4	3,7	2,2
	65-69 ans	3,2	3,8	2,7	4,9	4,4	3,7	2,6
	70-74 ans	3,6	4,4	3	6,3	6	4,2	2,9
	50-74 ans	2,9	3,4	2,4	3,3	2,6	3,5	2,4
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,9	97,4	98,5	97,8	99	96,7	97,8
	55-59 ans	98	98,4	97,5	100	100	98,1	97,1
	60-64 ans	97,5	97,8	97,2	97,1	100	97,9	96,7
	65-69 ans	96,5	95,7	97,4	100	100	95,3	97
	70-74 ans	94,9	93,8	96,1	95	100	93,7	95,6
	50-74 ans	97	96,7	97,3	98	99,5	96,4	96,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,1	93,7	90,2	92,5	89,2	95,5	91,2
	55-59 ans	93,8	95,2	92,2	97,2	96,4	94,8	91,7
	60-64 ans	93,2	92,5	94,2	91,2	96,6	92,7	93,8
	65-69 ans	94,2	94,7	93,5	90	95,5	95,1	93,3
	70-74 ans	91,1	92,5	89,4	78,9	95,8	93,8	88,6
	50-74 ans	92,9	93,7	91,9	91,8	92,7	94,1	91,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,7	98,6	98,9	98,4	97,8	98,8	100
	55-59 ans	97,3	97,5	97,2	97,1	88,9	97,5	98,4
	60-64 ans	97,5	97,5	97,4	96,8	85,7	97,6	99,4
	65-69 ans	95,9	96,2	95,4	94,4	100	96,4	94,8
	70-74 ans	96,4	96,7	96,1	86,7	87	97,4	97,4
	50-74 ans	97,2	97,3	97	96,9	93,7	97,4	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	94	96	85	109	106	81
	55-59 ans	98	103	92	114	106	101	90
	60-64 ans	85	83	88	94	114	81	83
	65-69 ans	88	92	82	64	106	94	79

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	102	108	95	137	112	106	93
	50-74 ans	93	95	91	93	109	96	86
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,2	2,6	6,1	4,4	6,8	0	5,4
	55-59 ans	1,4	0,8	2,1	2,8	3,6	0,5	1,9
	60-64 ans	2,3	2,5	1,9	0	3,4	2,9	1,6
	65-69 ans	2,3	2,6	2,1	10	4,5	1,9	1,8
	70-74 ans	3,1	3,3	2,9	10	0	2,7	3,3
	50-74 ans	2,6	2,4	3	4,4	4,9	1,9	2,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,7	54,5	63,8	61,3	68,1	44,7	59
	55-59 ans	53,6	44,9	63,1	48,6	66,7	44,3	62,6
	60-64 ans	42,4	30,9	59,2	25,8	53,6	31,5	60,1
	65-69 ans	41,1	31,9	52,3	50	57,1	30,3	51,6
	70-74 ans	39,3	29,9	50,6	13,3	47,8	31,1	51
	50-74 ans	47	38	58	50,2	62,1	35,1	57
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,5	7,7	5,2	8,1	6,6	7,1	3,6
	55-59 ans	6,9	7,6	6,1	8,6	3,7	7,5	6,4
	60-64 ans	6,4	6	7,1	6,5	7,1	5,9	7,1
	65-69 ans	8	7	9,2	5,6	14,3	7,2	8,5
	70-74 ans	7,2	7,1	7,3	13,3	8,7	6,6	7,1
	50-74 ans	7	7	6,9	8,1	7,4	6,8	6,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	1	0	0,8	0	1,2	0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,5	0	3,7	1	0
	60-64 ans	0,4	0	1	0	3,6	0	0,6
	65-69 ans	1,3	1,9	0,6	0	0	2,1	0,7
	70-74 ans	0,5	0,5	0,6	0	0	0,5	0,6
	50-74 ans	0,7	0,8	0,5	0,4	1,1	0,9	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	12,4	9,2	8,9	8,8	17,6	9,6
	55-59 ans	10,4	11	9,8	8,6	7,4	11,4	10,2
	60-64 ans	18,1	20,4	14,8	9,7	7,1	21,7	16,1
	65-69 ans	17,1	21,6	11,5	5,6	14,3	23,1	11,1
	70-74 ans	15,9	19	12,4	33,3	17,4	17,9	11,6
	50-74 ans	14,5	17	11,5	10,3	10	18,6	11,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,9	17,2	14,4	15,3	12,1	20	16,9
	55-59 ans	20,4	27,5	12,6	25,7	7,4	27,9	13,4
	60-64 ans	20,6	26	12,8	29	21,4	25,6	11,3
	65-69 ans	19,1	23,5	13,8	11,1	14,3	24,6	13,7
	70-74 ans	24,4	31,3	16,3	26,7	8,7	31,6	17,4
	50-74 ans	20,1	25,2	13,9	19,3	12,6	26,6	14,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	5,3	2,9	3,2	2,2	8,2	3,6
	55-59 ans	4,7	5,5	3,7	8,6	7,4	5	3,2
	60-64 ans	8,3	11,9	3,1	16,1	3,6	11,4	3
	65-69 ans	9,6	10,3	8,6	16,7	0	9,7	9,8
	70-74 ans	8,7	9	8,4	13,3	8,7	8,7	8,4
	50-74 ans	7,1	8,6	5,2	7,6	3,7	8,8	5,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	1	3,4	1,6	2,2	0	4,8
	55-59 ans	2,4	1,7	3,3	0	3,7	2	3,2
	60-64 ans	3,1	4,6	1	12,9	3,6	3,5	0,6
	65-69 ans	3,9	3,8	4	11,1	0	3,1	4,6
	70-74 ans	1,8	0,9	2,8	0	4,3	1	2,6
	50-74 ans	2,7	2,5	2,9	3,6	2,6	2,3	2,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	1,1	0,8	0	1,2	2,4
	55-59 ans	0,9	0,8	0,9	0	0	1	1,1
	60-64 ans	0,6	0,4	1	0	0	0,4	1,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,1	2,4	1,7	0	4,3	2,6	1,3
	50-74 ans	0,9	0,9	1	0,4	0,5	1	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	7,6	4,3	6,4	3,7	9,3	5
	55-59 ans	7,3	10,3	4,7	10,3	3,5	10,2	4,8
	60-64 ans	10,7	15,8	5,9	14,2	9,3	16	5,6
	65-69 ans	10,6	15,6	6,2	7,3	12	16,2	5,8
	70-74 ans	12,7	19,1	7,5	28,6	15,1	18,5	7
	50-74 ans	9,1	13,1	5,6	8,9	5,3	14,2	5,6
	50-74 ans **	9	12,8	5,5
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,4	2,6	4,1	2,1	4,9	3,2
	55-59 ans	4,8	7,3	2,6	7,7	1,8	7,3	2,8
	60-64 ans	5,7	8,9	2,7	10,7	7	8,7	2,3
	65-69 ans	5,6	8,1	3,4	4,9	6	8,4	3,2
	70-74 ans	7,7	11,9	4,3	12,7	5	11,8	4,2
	50-74 ans	5,3	7,9	3	5,8	3	8,4	3,1
	50-74 ans **	5,2	7,7	3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,4	0,5	0,9	0,4	2	0,7
	55-59 ans	1,1	1,5	0,8	2,6	1,8	1,3	0,7
	60-64 ans	2,3	4,1	0,7	5,9	1,2	3,9	0,6
	65-69 ans	2,8	3,6	2,1	7,3	0	3,3	2,3
	70-74 ans	2,8	3,4	2,2	6,3	5	3,2	2
	50-74 ans	1,9	2,7	1,1	2,3	0,9	2,8	1,2
	50-74 ans **	1,8	2,6	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3,6	6,7	0	0	0	7,7	0
	70-74 ans	3,3	6,3	0	0	0	7,1	0
	50-74 ans	1,5	2,3	0	0	0	2,8	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des