

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	25827	11760	14067	11482	13517	278	550
	55-59 ans	25942	11420	14522	10792	13251	628	1271
	60-64 ans	27716	12658	15058	11616	13474	1042	1584
	65-69 ans	19265	9278	9987	8272	8338	1006	1649
	70-74 ans	16393	6873	9520	5566	7733	1307	1787
	50-74 ans	115143	51989	63154	47728	56313	4261	6841
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1755	750	1005	734	981	16	24
	55-59 ans	1628	664	964	637	912	27	52
	60-64 ans	1620	707	913	665	839	42	74
	65-69 ans	1239	591	648	542	564	49	84
	70-74 ans	1157	465	692	417	598	48	94
	50-74 ans	7399	3177	4222	2995	3894	182	328
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1178	467	711	456	698	11	13
	55-59 ans	1110	442	668	424	633	18	35
	60-64 ans	1154	505	649	476	601	29	48
	65-69 ans	883	409	474	374	411	35	63
	70-74 ans	789	304	485	271	417	33	68
	50-74 ans	5114	2127	2987	2001	2760	126	227
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	577	283	294	278	283	5	11
	55-59 ans	518	222	296	213	279	9	17
	60-64 ans	466	202	264	189	238	13	26
	65-69 ans	356	182	174	168	153	14	21
	70-74 ans	368	161	207	146	181	15	26
	50-74 ans	2285	1050	1235	994	1134	56	101
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	25250	11477	13773	11204	13234	273	539
	55-59 ans	25424	11198	14226	10579	12972	619	1254
	60-64 ans	27250	12456	14794	11427	13236	1029	1558
	65-69 ans	18909	9096	9813	8104	8185	992	1628
	70-74 ans	16025	6712	9313	5420	7552	1292	1761
	50-74 ans	112858	50939	61919	46734	55179	4205	6740
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	580	296	284	291	267	5	17
	55-59 ans	682	345	337	317	311	28	26
	60-64 ans	837	465	372	418	340	47	32
	65-69 ans	614	328	286	289	241	39	45
	70-74 ans	559	274	285	221	233	53	52
	50-74 ans	3272	1708	1564	1536	1392	172	172
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	578	296	282	291	265	5	17
	55-59 ans	679	345	334	317	308	28	26
	60-64 ans	832	461	371	414	339	47	32
	65-69 ans	605	323	282	285	238	38	44
	70-74 ans	552	270	282	217	230	53	52
	50-74 ans	3246	1695	1551	1524	1380	171	171
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	515	266	249	262	233	4	16
	55-59 ans	608	309	299	282	274	27	25
	60-64 ans	761	429	332	384	303	45	29
	65-69 ans	558	305	253	269	209	36	44
	70-74 ans	482	237	245	191	199	46	46
	50-74 ans	2924	1546	1378	1388	1218	158	160
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	509	264	245	260	229	4	16
	55-59 ans	596	304	292	277	268	27	24
	60-64 ans	749	424	325	380	297	44	28
	65-69 ans	544	298	246	262	205	36	41
	70-74 ans	469	228	241	183	197	45	44

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	2867	1518	1349	1362	1196	156	153
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	4	0	4	0	3	0	1
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	12	6	6	6	5	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	2	4	2	3	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	506	262	244	258	229	4	15
	55-59 ans	600	304	296	277	272	27	24
	60-64 ans	753	425	328	380	300	45	28
	65-69 ans	544	298	246	263	205	35	41
	70-74 ans	475	232	243	186	197	46	46
	50-74 ans	2878	1521	1357	1364	1203	157	154
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	9	4	5	4	4	0	1
	55-59 ans	8	5	3	5	2	0	1
	60-64 ans	8	4	4	4	3	0	1
	65-69 ans	14	7	7	6	4	1	3
	70-74 ans	7	5	2	5	2	0	0
	50-74 ans	46	25	21	24	15	1	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	8	3	5	2	4	1	1
	70-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
	50-74 ans	20	8	12	7	10	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	510	265	245	261	229	4	16
	55-59 ans	600	306	294	279	269	27	25
	60-64 ans	754	427	327	383	299	44	28
	65-69 ans	550	302	248	266	207	36	41
	70-74 ans	478	234	244	189	199	45	45
	50-74 ans	2892	1534	1358	1378	1203	156	155
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	515	266	249	262	233	4	16
	55-59 ans	611	311	300	284	275	27	25
	60-64 ans	766	431	335	386	306	45	29
	65-69 ans	566	308	258	271	213	37	45
	70-74 ans	486	238	248	192	201	46	47
	50-74 ans	2944	1554	1390	1395	1228	159	162
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	255	113	142	110	133	3	9
	55-59 ans	297	128	169	121	154	7	15
	60-64 ans	317	144	173	127	156	17	17
	65-69 ans	244	112	132	99	106	13	26
	70-74 ans	187	76	111	57	93	19	18
	50-74 ans	1300	573	727	514	642	59	85
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	39	21	18	20	16	1	2
	55-59 ans	44	27	17	23	15	4	2
	60-64 ans	48	24	24	20	22	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	25	9	16	9	11	0	5
	70-74 ans	23	11	12	10	11	1	1
	50-74 ans	179	92	87	82	75	10	12
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	26	15	11	15	11	0	0
	55-59 ans	22	10	12	9	11	1	1
	60-64 ans	60	33	27	30	26	3	1
	65-69 ans	33	19	14	16	12	3	2
	70-74 ans	19	12	7	10	5	2	2
	50-74 ans	160	89	71	80	65	9	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	54	34	20	34	18	0	2
	55-59 ans	73	45	28	40	27	5	1
	60-64 ans	79	48	31	39	30	9	1
	65-69 ans	66	40	26	34	23	6	3
	70-74 ans	67	37	30	29	22	8	8
	50-74 ans	339	204	135	176	120	28	15
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	92	55	37	55	36	0	1
	55-59 ans	106	66	40	60	36	6	4
	60-64 ans	172	122	50	114	44	8	6
	65-69 ans	132	84	48	71	44	13	4
	70-74 ans	108	53	55	44	44	9	11
	50-74 ans	610	380	230	344	204	36	26
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	27	16	11	16	10	0	1
	55-59 ans	44	24	20	23	19	1	1
	60-64 ans	62	42	20	41	20	1	0
	65-69 ans	48	38	10	37	8	1	2
	70-74 ans	58	38	20	33	18	5	2
	50-74 ans	239	158	81	150	75	8	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	11	5	6	5	6	0	0
	55-59 ans	9	2	7	2	7	0	0
	60-64 ans	11	7	4	6	3	1	1
	65-69 ans	9	3	6	3	4	0	2
	70-74 ans	6	4	2	3	1	1	1
	50-74 ans	46	21	25	19	21	2	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	7	1	7	0	0	1
	55-59 ans	11	8	3	5	2	3	1
	60-64 ans	13	9	4	8	4	1	0
	65-69 ans	7	2	5	1	4	1	1
	70-74 ans	15	6	9	5	6	1	3
	50-74 ans	54	32	22	26	16	6	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	5	1	4	1	4	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	50-74 ans	17	5	12	4	10	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	146	89	57	89	54	0	3
	55-59 ans	179	111	68	100	63	11	5
	60-64 ans	251	170	81	153	74	17	7
	65-69 ans	198	124	74	105	67	19	7
	70-74 ans	175	90	85	73	66	17	19
	50-74 ans	949	584	365	520	324	64	41
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	92	55	37	55	36	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	106	66	40	60	36	6	4
	60-64 ans	172	122	50	114	44	8	6
	65-69 ans	132	84	48	71	44	13	4
	70-74 ans	108	53	55	44	44	9	11
	50-74 ans	610	380	230	344	204	36	26
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	27	16	11	16	10	0	1
	55-59 ans	44	24	20	23	19	1	1
	60-64 ans	62	42	20	41	20	1	0
	65-69 ans	48	38	10	37	8	1	2
	70-74 ans	58	38	20	33	18	5	2
	50-74 ans	239	158	81	150	75	8	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	26	16	10	16	9	0	1
	55-59 ans	40	21	19	20	18	1	1
	60-64 ans	58	38	20	37	20	1	0
	65-69 ans	45	35	10	35	8	0	2
	70-74 ans	53	34	19	30	17	4	2
	50-74 ans	222	144	78	138	72	6	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	5	5	0	5	0	0	0
	70-74 ans	8	5	3	5	3	0	0
	50-74 ans	23	16	7	16	7	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	22	14	8	14	7	0	1
	55-59 ans	36	19	17	18	16	1	1
	60-64 ans	56	36	20	35	20	1	0
	65-69 ans	40	30	10	30	8	0	2
	70-74 ans	45	29	16	25	14	4	2
	50-74 ans	199	128	71	122	65	6	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	11	7	4	7	4	0	0
	55-59 ans	26	15	11	14	11	1	0
	60-64 ans	36	21	15	21	15	0	0
	65-69 ans	27	20	7	20	5	0	2
	70-74 ans	28	19	9	16	7	3	2
	50-74 ans	128	82	46	78	42	4	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	11	7	4	7	3	0	1
	55-59 ans	10	4	6	4	5	0	1
	60-64 ans	20	15	5	14	5	1	0
	65-69 ans	13	10	3	10	3	0	0
	70-74 ans	17	10	7	9	7	1	0
	50-74 ans	71	46	25	44	23	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	13	6	7	6	7	0	0
	60-64 ans	18	12	6	12	6	0	0
	65-69 ans	14	12	2	12	2	0	0
	70-74 ans	8	5	3	5	2	0	1
	50-74 ans	56	37	19	37	18	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0
	65-69 ans	6	3	3	3	2	0	1
	70-74 ans	8	4	4	4	3	0	1
	50-74 ans	30	16	14	16	12	0	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	7	5	2	4	2	1	0
	60-64 ans	10	4	6	4	6	0	0
	65-69 ans	7	5	2	5	1	0	1
	70-74 ans	6	5	1	4	1	1	0
	50-74 ans	34	22	12	20	11	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	5	1	3	1	2	0
	50-74 ans	8	7	1	5	1	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	23	14	9	14	8	0	1
	55-59 ans	39	20	19	19	18	1	1
	60-64 ans	57	37	20	36	20	1	0
	65-69 ans	44	34	10	34	8	0	2
	70-74 ans	48	30	18	26	16	4	2
	50-74 ans	211	135	76	129	70	6	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	37	21	16	21	16	0	0
	55-59 ans	26	16	10	15	10	1	0
	60-64 ans	21	13	8	12	8	1	0
	65-69 ans	17	6	11	6	11	0	0
	70-74 ans	16	6	10	5	7	1	3
	50-74 ans	117	62	55	59	52	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	6,4	7,1	6,4	7,3	5,8	4,4	
	55-59 ans	6,3	5,8	6,6	5,9	6,9	4,3	4,1	
	60-64 ans	5,8	5,6	6,1	5,7	6,2	4	4,7	
	65-69 ans	6,4	6,4	6,5	6,6	6,8	4,9	5,1	
	70-74 ans	7,1	6,8	7,3	7,5	7,7	3,7	5,3	
	50-74 ans	6,4	6,1	6,7	6,3	6,9	4,3	4,8	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,4	2,1	2,4	2,1	1,8	2	
	55-59 ans	2	1,9	2	2	2,1	1,4	1,3	
	60-64 ans	1,7	1,6	1,8	1,6	1,8	1,2	1,6	
	65-69 ans	1,8	2	1,7	2	1,8	1,4	1,3	
	70-74 ans	2,2	2,3	2,2	2,6	2,3	1,1	1,5	
	50-74 ans	2	2	2	2,1	2	1,3	1,5	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,1	62,3	70,7	62,1	71,2	68,8	54,2	
	55-59 ans	68,2	66,6	69,3	66,6	69,4	66,7	67,3	
	60-64 ans	71,2	71,4	71,1	71,6	71,6	69	64,9	
	65-69 ans	71,3	69,2	73,1	69	72,9	71,4	75	
	70-74 ans	68,2	65,4	70,1	65	69,7	68,8	72,3	
	50-74 ans	69,1	66,9	70,7	66,8	70,9	69,2	69,2	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,6	2,1	2,6	2	1,8	3,2	
	55-59 ans	2,7	3,1	2,4	3	2,4	4,5	2,1	
	60-64 ans	3,1	3,7	2,5	3,7	2,6	4,6	2,1	
	65-69 ans	3,2	3,6	2,9	3,6	2,9	3,9	2,8	
	70-74 ans	3,5	4,1	3,1	4,1	3,1	4,1	3	
	50-74 ans	2,9	3,4	2,5	3,3	2,5	4,1	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	100	99,3	100	99,3	100	100	
	55-59 ans	99,6	100	99,1	100	99	100	100	
	60-64 ans	99,4	99,1	99,7	99	99,7	100	100	
	65-69 ans	98,5	98,5	98,6	98,6	98,8	97,4	97,8	
	70-74 ans	98,7	98,5	98,9	98,2	98,7	100	100	
	50-74 ans	99,2	99,2	99,2	99,2	99,1	99,4	99,4	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,1	89,9	88,3	90	87,9	80	94,1	
	55-59 ans	89,5	89,6	89,5	89	89	96,4	96,2	
	60-64 ans	91,5	93,1	89,5	92,8	89,4	95,7	90,6	
	65-69 ans	92,2	94,4	89,7	94,4	87,8	94,7	100	
	70-74 ans	87,3	87,8	86,9	88	86,5	86,8	88,5	
	50-74 ans	90,1	91,2	88,8	91,1	88,3	92,4	93,6	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	99,2	98,4	99,2	98,3	100	100	
	55-59 ans	98	98,4	97,7	98,2	97,8	100	96	
	60-64 ans	98,4	98,8	97,9	99	98	97,8	96,6	
	65-69 ans	97,5	97,7	97,2	97,4	98,1	100	93,2	
	70-74 ans	97,3	96,2	98,4	95,8	99	97,8	95,7	
	50-74 ans	98,1	98,2	97,9	98,1	98,2	98,7	95,6	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80	90	70	90	71	59	59	
	55-59 ans	83	83	83	84	84	76	67	
	60-64 ans	76	76	74	78	76	66	58	
	65-69 ans	75	84	64	88	63	55	69	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	77	84	71	89	75	63	57
	50-74 ans	78	83	73	85	74	64	62
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,4	7,1	5,6	7,2	6	0	0
	55-59 ans	3,8	4,6	3	4,7	3,2	3,6	0
	60-64 ans	2,5	2,8	2,2	2,9	2,4	2,1	0
	65-69 ans	2,8	1,8	3,8	2,1	4,6	0	0
	70-74 ans	2,9	2,2	3,5	2,3	3	1,9	5,8
	50-74 ans	3,6	3,6	3,5	3,8	3,7	1,7	1,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	99,6	98,4	99,6	98,3	100	100
	55-59 ans	98,7	99	98,3	98,9	98,2	100	100
	60-64 ans	99,1	99,5	98,5	99,7	98,7	97,8	96,6
	65-69 ans	98,6	99	98	98,9	99	100	93,2
	70-74 ans	99,2	98,7	99,6	99	100	97,8	97,8
	50-74 ans	98,9	99,2	98,5	99,3	98,8	98,7	96,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,5	42,5	57	42	57,1	75	56,3
	55-59 ans	48,6	41,2	56,3	42,6	56	25,9	60
	60-64 ans	41,4	33,4	51,6	32,9	51	37,8	58,6
	65-69 ans	43,1	36,4	51,2	36,5	49,8	35,1	57,8
	70-74 ans	38,5	31,9	44,8	29,7	46,3	41,3	38,3
	50-74 ans	44,2	36,9	52,3	36,8	52,3	37,1	52,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,6	7,9	7,2	7,6	6,9	25	12,5
	55-59 ans	7,2	8,7	5,7	8,1	5,5	14,8	8
	60-64 ans	6,3	5,6	7,2	5,2	7,2	8,9	6,9
	65-69 ans	4,4	2,9	6,2	3,3	5,2	0	11,1
	70-74 ans	4,7	4,6	4,8	5,2	5,5	2,2	2,1
	50-74 ans	6,1	5,9	6,3	5,9	6,1	6,3	7,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	5	5,6	4,4	5,7	4,7	0	0
	55-59 ans	3,6	3,2	4	3,2	4	3,7	4
	60-64 ans	7,8	7,7	8,1	7,8	8,5	6,7	3,4
	65-69 ans	5,8	6,2	5,4	5,9	5,6	8,1	4,4
	70-74 ans	3,9	5	2,8	5,2	2,5	4,3	4,3
	50-74 ans	5,4	5,7	5,1	5,7	5,3	5,7	3,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,5	12,8	8	13	7,7	0	12,5
	55-59 ans	11,9	14,5	9,3	14,1	9,8	18,5	4
	60-64 ans	10,3	11,1	9,3	10,1	9,8	20	3,4
	65-69 ans	11,7	13	10,1	12,5	10,8	16,2	6,7
	70-74 ans	13,8	15,5	12,1	15,1	10,9	17,4	17
	50-74 ans	11,5	13,1	9,7	12,6	9,8	17,6	9,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,9	20,7	14,9	21	15,5	0	6,3
	55-59 ans	17,3	21,2	13,3	21,1	13,1	22,2	16
	60-64 ans	22,5	28,3	14,9	29,5	14,4	17,8	20,7
	65-69 ans	23,3	27,3	18,6	26,2	20,7	35,1	8,9
	70-74 ans	22,2	22,3	22,2	22,9	21,9	19,6	23,4
	50-74 ans	20,7	24,5	16,5	24,7	16,6	22,6	16
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	6	4,4	6,1	4,3	0	6,3
	55-59 ans	7,2	7,7	6,7	8,1	6,9	3,7	4
	60-64 ans	8,1	9,7	6	10,6	6,5	2,2	0
	65-69 ans	8,5	12,3	3,9	13,7	3,8	2,7	4,4
	70-74 ans	11,9	16	8,1	17,2	9	10,9	4,3
	50-74 ans	8,1	10,2	5,8	10,8	6,1	5	3,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	1,9	2,4	1,9	2,6	0	0
	55-59 ans	1,5	0,6	2,3	0,7	2,5	0	0
	60-64 ans	1,4	1,6	1,2	1,6	1	2,2	3,4
	65-69 ans	1,6	1	2,3	1,1	1,9	0	4,4
	70-74 ans	1,2	1,7	0,8	1,6	0,5	2,2	2,1
	50-74 ans	1,6	1,4	1,8	1,4	1,7	1,3	2,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	2,6	0,4	2,7	0	0	6,3
	55-59 ans	1,8	2,6	1	1,8	0,7	11,1	4
	60-64 ans	1,7	2,1	1,2	2,1	1,3	2,2	0
	65-69 ans	1,2	0,6	1,9	0,4	1,9	2,7	2,2
	70-74 ans	3,1	2,5	3,6	2,6	3	2,2	6,4
	50-74 ans	1,8	2,1	1,6	1,9	1,3	3,8	3,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0	1,2	0	1,3	0	0
	55-59 ans	0,8	0,3	1,3	0,4	1,5	0	0
	60-64 ans	0,5	0,5	0,6	0,3	0,3	2,2	3,4
	65-69 ans	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0	0
	70-74 ans	0,6	0,4	0,8	0,5	0,5	0	2,1
	50-74 ans	0,6	0,3	0,9	0,3	0,8	0,6	1,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	7,8	4,1	7,9	4,1	0	5,6
	55-59 ans	7	9,9	4,8	9,5	4,9	17,8	4
	60-64 ans	9,2	13,6	5,5	13,4	5,6	16,5	4,5
	65-69 ans	10,5	13,6	7,5	13	8,2	19,2	4,3
	70-74 ans	10,9	13,4	9,1	13,5	8,7	13,2	10,8
	50-74 ans	8,4	11,5	5,9	11,1	5,9	15,2	6,1
	50-74 ans **	8,4	11,2	5,9
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	4,8	2,7	4,9	2,7	0	1,9
	55-59 ans	4,2	5,9	2,8	5,7	2,8	9,7	3,2
	60-64 ans	6,3	9,8	3,4	10	3,3	7,8	3,9
	65-69 ans	7	9,2	4,9	8,8	5,4	13,1	2,5
	70-74 ans	6,7	7,9	5,9	8,1	5,8	7	6,2
	50-74 ans	5,4	7,5	3,7	7,4	3,7	8,6	3,9
	50-74 ans **	5,4	7,2	3,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,4	0,8	1,4	0,8	0	1,9
	55-59 ans	1,7	2,1	1,4	2,2	1,5	1,6	0,8
	60-64 ans	2,3	3,4	1,4	3,6	1,5	1	0
	65-69 ans	2,5	4,2	1	4,6	1	1	1,2
	70-74 ans	3,6	5,7	2,1	6,1	2,4	3,9	1,1
	50-74 ans	2,1	3,1	1,3	3,2	1,4	1,9	0,9
	50-74 ans **	2,1	3	1,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	15,4	12,5	20	12,5	22,2	0	0
	55-59 ans	10	9,5	10,5	10	11,1	0	0
	60-64 ans	3,4	5,3	0	5,4	0	0	0
	65-69 ans	11,1	14,3	0	14,3	0	0	0
	70-74 ans	15,1	14,7	15,8	16,7	17,6	0	0
	50-74 ans	10,4	11,1	9	11,6	9,7	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des